

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais (10 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

1) Considerando o relatório final da 8ª conferência Nacional de Saúde, no que diz respeito aos princípios referentes às condições de acesso e qualidade, assinale a alternativa que **não** expressa o que diz o texto do referido relatório:

- a) Direito a acompanhante ao doente internado, especialmente os idosos.
- b) Equidade em relação ao acesso.
- c) Universalização em relação à cobertura populacional.
- d) Direito à assistência psicológica.
- e) Atendimento oportuno segundo as necessidades.

2) Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - II. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
 - III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, integralidade, gratuidade e controle social.
- a) Apenas III é correta.
 - b) Apenas II e III são corretas.
 - c) Apenas I e II são corretas.
 - d) I, II e III são incorretas.
 - e) I, II e III são corretas.

3) Sobre a lei 8080/90, é **incorreto** afirmar:

- a) Expressou a participação da comunidade como um princípio do SUS.
- b) Não faz menção à humanização do atendimento.
- c) Expressou a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, como um princípio do SUS.
- d) Expressou a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, como um princípio do SUS.
- e) Expressou a Saúde da Família, como estratégia fundamental de reorganização da Atenção Básica.

4) Considerando a lei 8142/90, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada exclusivamente pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e não deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 - III. O Sistema Único de Saúde - SUS de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e o Consórcio de Saúde.
- a) Apenas III é correta.
 - b) Apenas II e III são corretas.
 - c) Apenas I e II são corretas.
 - d) I, II e III são incorretas.
 - e) I, II e III são corretas.

5) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, **EXCETO**:

- a) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades.
- b) Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação com as gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da atenção básica.
- c) Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica.
- d) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica.
- e) Estimular a participação popular e o controle social.

6) É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Essa proibição deixa de existir, nas seguintes situações, **EXCETO**:

- a) Autorização expressa do paciente.
- b) Quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente.
- c) Informação às seguradoras sobre as circunstâncias da morte de paciente seu, além daquelas contidas no próprio atestado de óbito, quando há expressa autorização do responsável legal ou sucessor.
- d) Informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- e) Quando o segredo se refere a menor de idade e é revelado aos pais.

7) Paciente deu entrada à unidade de emergência com queixa típica de angina e sudorese. Fez ECG que confirmou infarto de parede inferior. Iniciou-se medicação específica, porém faleceu cerca de 1 hora após ser atendido e antes de ser internado, após apresentar queda de pressão intensa e não revertida. Neste caso, o atestado de óbito:

- a) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica choque cardiogênico.
- b) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica infarto agudo do miocárdio.
- c) Deve ser emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em decorrência do reduzido tempo de permanência no hospital.
- d) Deve ser emitido pelo médico que o atendeu, tendo como causa básica parada cardiorrespiratória.
- e) Deve ser emitido preferencialmente pelo SVO e, na ausência deste na localidade, pelo médico que constatou o óbito.

8) Segundo a lista nacional **não** é uma doença ou agravo de notificação compulsória.

- a) Violência doméstica.
- b) Hepatite por vírus A.
- c) Brucelose humana.
- d) Intoxicação por agrotóxico.
- e) Febre purpúrica brasileira.

- 9) Sobre os indicadores de saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.
- O coeficiente geral de mortalidade não é muito utilizado para comparar o nível de saúde de diferentes populações, pois não leva em consideração a estrutura etária dessas populações.
 - No cálculo do coeficiente de mortalidade materna entram, portanto, todos os casos de óbitos maternos, tanto por causas obstétricas diretas, como indiretas, que ocorreram em até 42 dias após o término da gestação.
 - Para compararmos o risco de ocorrência de doenças entre populações usamos, o coeficiente de prevalência.
- Apenas III é correta.
 - Apenas II e III são corretas.
 - Apenas I e II são corretas.
 - I, II e III são incorretas.
 - I, II e III são corretas.

10) Entre as diretrizes para a gestão do SUS, estabelecidas no Pacto de Gestão (2006), não se inclui:

- Regulação.
- Planejamento.
- Regionalização.
- Humanização.
- Gestão do Trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Sobre as características do método clínico centrado na pessoa, analise as abaixo e assinale a alternativa correta.

- Maior ênfase aos aspectos psicossociais do que às doenças.
 - Exploração da doença e da experiência de estar doente.
 - Considerar as hipóteses do paciente para o seu problema de saúde.
- Apenas II e III são corretas.
 - I, II e III são corretas.
 - Apenas I é correta.
 - I, II e III são incorretas.
 - Apenas II é correta.

12) Comparando o método clínico centrado na pessoa (MCCP), com o método clínico convencional (MCC), analise as abaixo e assinale a alternativa correta.

- O MCCP demanda um tempo de consulta excessivo, por vezes não compatível com a realidade da Atenção Primária.
 - No MCC, em cerca de 70% das vezes, o médico interrompe o paciente com elevada frequência.
 - Uma consulta utilizando o MCC é capaz de revelar menos de 10% dos diagnósticos de esferas psíquicas e sociais.
- I, II e III são corretas.
 - Apenas I é correta.
 - I, II e III são incorretas.
 - Apenas II é correta.
 - Apenas II e III são corretas.

13) Considerando a promoção e proteção à saúde da criança, assinale uma medida típica de promoção de saúde.

- Teste do pezinho.
- Vacinação contra a poliomielite.
- Combate ao sedentarismo.
- Diagnóstico precoce de hipertensão arterial.
- Diagnóstico precoce de distúrbios auditivos.

14) Considerando a promoção e proteção à saúde da mulher, assinale uma medida típica de proteção de saúde.

- Orientação sobre a sexualidade.
- Diagnóstico precoce de câncer de colo de útero.
- Rastreamento do diabetes mellitus durante a gestação.
- Vacina contra o papilomavírus humano (HPV).
- Alimentação saudável.

15) Considerando a população geral em uma comunidade brasileira cujo perfil em relação à faixa etária é semelhante ao país como um todo; é de se esperar que a prevalência de hipertensão arterial seja ao redor de:

- 10%.
- 15%.
- 30%.
- 20%.
- 5%.

16) Sobre os coeficientes, índices e indicadores de saúde da população, assinale a alternativa incorreta:

- A prevalência não mede o risco de ocorrência de uma doença na população.
- O coeficiente de natalidade está relacionado com o número de mulheres em idade fértil.
- Quanto melhores as condições de vida e de saúde, será menor a mortalidade infantil proporcional e maior o valor do Indicador de Swaroop e Uemura.
- O coeficiente de mortalidade por uma doença não reflete necessariamente sua gravidade.
- O coeficiente geral de mortalidade não é muito utilizado para comparar o nível de saúde de diferentes populações, pois não leva em consideração a estrutura etária dessas populações.

17) Considerando os exames de rastreamento do colo do útero, analise as diretrizes abaixo e assinale a alternativa correta:

- Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
 - O rastreamento em gestantes não deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária para as demais mulheres, devendo ser postergado para o período pós-gestacional.
 - Não há indicação para rastreamento do câncer do colo do útero e seus precursores no grupo de mulheres sem atividade sexual.
- I, II e III são corretas.
 - Apenas I é correta.
 - I, II e III são incorretas.
 - Apenas II é correta.
 - Apenas I e III são corretas.

18) Sobre o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama por mamografia, em mulheres de risco normal, as diretrizes atuais do Ministério da Saúde/ INCA recomendam que seja feito:

- Em mulheres com idade entre 50 e 59 anos e entre 60 e 69 anos.
- Em mulheres com idade acima de 35 anos.
- Em mulheres com idade acima de 40 anos.
- Em mulheres com idade entre 40 e 49 anos.
- Em mulheres com idade entre 50 e 59 anos apenas.

19) O rastreamento do diabetes mellitus em pacientes adultos assintomáticos está indicado para todos os indivíduos, particularmente os com sobrepeso ou obesos a partir da idade de:

- 18 anos.
- 21 anos.
- 35 anos.
- 45 anos.
- 50 anos.

- 20) O rastreamento do diabetes mellitus em crianças assintomáticas com sobrepeso ou peso corporal > 120% do ideal para a altura está indicado, a partir dos 10 anos ou início da puberdade, caso ocorra pelo menos de uma série de fatores de risco, entre os quais não se inclui:
- História familiar em parentes de 1º e 2º graus de diabetes tipo 2.
 - Hipertensão arterial.
 - Baixo peso ao nascer para a idade gestacional.
 - História de diabetes gestacional na própria gestação da criança.
 - Síndrome dos ovários policísticos.
- 21) A Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) baseia-se em uma estrutura simples, fundada em dois eixos: 17 capítulos em um deles, com um código alfa cada, e sete componentes idênticos no outro, com rubricas numeradas com códigos de dois dígitos. Considerando os capítulos, as doenças do aparelho circulatório serão representadas pela letra.
- C
 - B
 - H
 - K
 - A
- 22) A Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) baseia-se em uma estrutura simples, fundada em dois eixos: 17 capítulos em um deles, com um código alfa cada, e sete componentes idênticos no outro, com rubricas numeradas com códigos de dois dígitos. Considerando os sete componentes iguais para todos os capítulos o componente de queixas e sintomas é representado pelo número.
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 7
- 23) Homem de 69 anos, em medidas repetidas em suas últimas consultas ambulatoriais para controle de diabetes, ocorridas nos últimos seis meses vem apresentando níveis pressóricos entre 140-144 x 90-92 mmHg. Faz uso regular de hidroclorotiazida 12,5 mg/dia. Sua conduta seria.
- Manter a medicação.
 - Reforçar dieta hipossódica.
 - Associar enalapril.
 - Substituir hidroclorotiazida por enalapril.
 - Aumentar a dose de hidroclorotiazida.
- 24) Homem de 79 anos, em medidas repetidas em suas últimas consultas ambulatoriais de rotina para acompanhamento de artrose de quadril, ocorridas nos últimos três meses, vem apresentando níveis pressóricos entre 140-142 x 90-94 mmHg. Não faz uso de medicação. Você indica monitorização residencial da pressão arterial, que mostra média de 138 x 88 mmHg. Seu diagnóstico é:
- Prejudicado, pois, a monitorização residencial de pressão arterial não é método validado para diagnóstico.
 - Hipertensão arterial.
 - Hipertensão do avental branco.
 - Pressão normal para a idade.
 - Pré-hipertensão.
- 25) Mulher de 67 anos, em exames realizados em sua última consulta ambulatorial de rotina para acompanhamento de quadro depressivo, realizada há 1 semana, apresentou glicose plasmática de jejum do dia anterior de 128 mg/dl, sendo recomendada a repetir o teste. O mesmo foi realizado dois dias depois da consulta com resultado de 127 mg/dl. O diagnóstico deve ser:
- Pré-diabetes.
 - Intolerância à glicose.
 - Glicose plasmática normal para a idade.
 - Confirmado pela dosagem da hemoglobina glicosilada.
 - Diabetes mellitus.
- 26) Sobre o tratamento farmacológico do diabetes mellitus, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- A metformina é a droga de escolha para o diabetes tipo 2.
 - Em pacientes com diabetes tipo 2, recentemente diagnosticados e muito sintomáticos, ou com elevadas dosagens da hemoglobina A1C, deve-se considerar iniciar a terapia com insulina.
 - Em pacientes com diabetes tipo 2 deve-se evitar a terapia com insulina em associação com hipoglicemiantes orais.
- I, II e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - I, II e III estão incorretas.
- 27) Você atende pela primeira vez um paciente masculino de 67 anos de idade, sabidamente diabético há dez anos, hipertenso controlado com amlodipino e hidroclorotiazida, fazendo uso regular de metformina 1 g/dia e aderente às recomendações não farmacológicas. Traz consigo controles laboratoriais realizados 3 dias antes que mostram:
- ✓ Glicemia de jejum = 111 mg/dl
 - ✓ Hemoglobina glicada = 6,5%
 - ✓ Creatinina sérica = 0,9 mg/dL, com depuração de creatinina estimada = 94 ml/minuto.
 - ✓ Exame de urina = sem alterações
 - ✓ Microalbuminúria = 12 µg/24 h.
- Em relação ao controle do diabetes é verdadeiro afirmar que:
- O paciente está fora de controle, devendo se aumentar a dose de metformina.
 - O paciente está controlado, devendo se manter a conduta.
 - O paciente está fora de controle, devendo se reforçar a orientação dietética.
 - O paciente está fora de controle, devendo se associar um segundo hipoglicemiante.
 - O paciente está controlado, sendo possível a redução da dose de metformina.
- 28) Em relação à avaliação da função renal do paciente da questão anterior, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:
- O paciente tem filtração glomerular normal.
 - O paciente não tem qualquer evidência de nefropatia diabética.
 - De acordo com a classificação da doença renal crônica, esse paciente teria estadiamente G0 A1.
- I, II e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão incorretas.
 - Apenas I e II estão corretas.

- 29) O quadro clínico varia de uma forma branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e/ou muco nas dejeções, até uma diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucóide, acompanhada de febre e calafrios. Este quadro pode ser causado por um parasita, que é a (o):
- Giardia lamblia.
 - Ascaris lumbricoides.
 - Entamoeba histolytica.
 - Shigella dysenteriae.
 - Hymenolepis nana.
- 30) Sobre o sarampo, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- O período prodrômico ou catarral tem duração de 6 dias, no início da doença, surge febre, acompanhada de tosse produtiva, corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e fotofobia.
 - Período exantemático ocorre o exantema característico, maculopapular, de cor avermelhada, com distribuição em sentido céfalo-caudal, que surge na região retro-articular e face.
 - No período exantemático ocorre atenuação de todos os sintomas do período prodrômico.
- Apenas I e II estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão incorretas.
- 31) Entre as alternativas abaixo a definição mais adequada para prevenção quaternária é:
- Construção da autonomia dos sujeitos e na detecção de indivíduos em risco de sobretreamento ou excesso de prevenção, para protegê-los de intervenções profissionais inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.
 - Conjunto de ações e cuidados paliativos para minimizar o sofrimento de indivíduos com doenças ou agravos irreversíveis.
 - Conjunto de saberes e experiências no planejamento, execução e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas.
 - Cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação ou a manutenção em equilíbrio funcional.
 - Cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação e a atenção integral.
- 32) Entre as abaixo não é uma estratégia típica de promoção de saúde.
- Não ingestão de tabaco.
 - Combate à fome e ao desemprego.
 - Ações de orientação para cuidados com o ambiente.
 - O rastreamento de câncer de próstata em homens acima de 50 anos.
 - Combate ao estresse no ambiente de trabalho.
- 33) Uma professora de 46 anos, após desentendimento com classe de estudantes, ocorrido há 1 mês, vem apresentando choro fácil, fadiga intensa, perda de interesse pelas atividades habituais e sono perturbado. Não relata outras queixas e está afastada do trabalho. O diagnóstico provável é:
- Depressão moderada.
 - Depressão leve.
 - Ansiedade social.
 - Estresse pós-traumático.
 - Depressão grave.
- 34) O tratamento farmacológico inicial do transtorno da ansiedade social, deve ser feito inicialmente com as seguintes drogas, EXCETO:
- Sertralina.
 - Escitalopram.
 - Venlafaxina.
 - Paroxetina.
 - Bromazepam.
- 35) Baseado em campanha relacionada à prevenção de doenças renais, um paciente masculino afrodescendente não diabético, hipertenso, de 59 anos, realizou dosagem sérica da creatinina, cujo resultado foi de 1,4 mg/dl. Sua filha é técnica de enfermagem da unidade em que você trabalha e lhe pergunta acerca da função renal de seu pai. A melhor resposta seria:
- A função renal é normal.
 - O exame sugere função renal levemente alterada.
 - O resultado do exame por si só não permite avaliar com precisão a função renal.
 - O paciente deve realizar depuração da creatinina de 24 horas.
 - O paciente deve realizar outros exames como ureia e potássio.
- 36) A sensação de estar acabado, ou síndrome do esgotamento profissional (burn out), é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Considerando, suas manifestações principais, entre as abaixo, assinale a incorreta:
- Sentimentos de desgaste emocional.
 - Esvaziamento afetivo.
 - Sensação de diminuição da competência e de sucesso no trabalho.
 - Reação negativa.
 - Apego excessivo do público que deve receber os serviços ou cuidados do paciente.
- 37) Os sinais e sintomas de LER/DORT são múltiplos e diversificados. Analise os abaixo e assinale aquele menos frequentemente observado:
- Dor espontânea ou à movimentação passiva, ativa ou contra resistência.
 - Sinais flogísticos.
 - Dificuldades para o uso dos membros, particularmente das mãos.
 - Parestesias.
 - Fraqueza e cansaço nas regiões acometidas.
- 38) Sobre o diagnóstico da asma ocupacional, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
- Medidas objetivas, como curvas seriadas de PFE ou testes de broncoprovocação, tem pouco valor diagnóstico, ao contrário que se observa na asma não relacionada à exposição ocupacional.
 - Todo caso de asma iniciado ou agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível causa ocupacional.
 - A melhora dos sintomas em períodos de afastamento do trabalho, em finais de semana ou nas férias é sugestiva de asma relacionada ao trabalho.
- Apenas I e II estão corretas.
 - I, II e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - I, II e III estão incorretas.

39) De acordo com a Associação Americana de Diabetes, em suas diretrizes atuais (2015), uma das estratégias para diagnóstico do diabetes gestacional é a realização do teste de tolerância oral à glicose em uma etapa com 75 gramas de glicose oral. O teste é realizado após jejum noturno de pelo menos 8 horas, com dosagens de glicose plasmática de jejum, 1 e 2 horas após a ingestão da glicose. A concentração de glicose plasmática na 1ª hora, a partir da qual, por esse teste se considera o diagnóstico de diabetes gestacional é:

- a) 180 mg/dl
- b) 190 mg/dl
- c) 153 mg/dl
- d) 145 mg/dl
- e) 170 mg/dl

40) De acordo com a Associação Americana de Diabetes (ADA) em suas diretrizes atuais (2015), em pacientes diabetes gestacional o alvo para controle glicêmico corresponde a um pico pós prandial (1 hora após a refeição) de no máximo:

- a) 120 mg/dl.
- b) 126 mg/dl.
- c) 140 mg/dl.
- d) 130 mg/dl.
- e) 153 mg/dl.

41) Um dos aspectos relevantes no ciclo gravídico- puerperal é a segurança do uso de anti-hipertensivos em lactantes. Analise os anti-hipertensivos abaixo e assinale aquele que é completamente seguro nessa fase:

- a) Anlodipino.
- b) Prazosina.
- c) Metoprolol.
- d) Nifedipino.
- e) Valsartana.

42) Considerando os fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, analise os abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
- b) Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente.
- c) Altura menor do que 1,45m.
- d) Intervalo interpartal maior do que cinco anos.
- e) Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre.

43) Considerando os fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/ emergência obstétrica, analise as condições abaixo e assinale aquela que contém somente condições compatíveis com esse tipo de encaminhamento.

- I. Tuberculose.
 - II. Pressão arterial > 140/90, medida após um mínimo de 5 minutos de repouso, na posição sentada à proteinúria, detectada por teste rápido.
 - III. Idade gestacional com 41 semanas ou mais confirmada.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I está correta.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) I, II e III estão incorretas.

44) Considerando aspectos comparativos entre o paradigma biomédico-cartesiano e o paradigma biopsicossocial da medicina de família e comunidade (MFC), analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Diferentemente da prática da medicina cartesiana, a Medicina biopsicossocial exige que o médico da MFC desenvolva competências no campo da abordagem psicoterapêutica.
 - II. A promoção da resiliência é um dos recursos característicos da Medicina praticada sob o paradigma biomédico-cartesiano.
 - III. Acerca da integralidade, a MFC aborda as interações pessoa-mundo, diferentemente do que ocorre na medicina praticada sob o paradigma biomédico-cartesiano.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I está correta.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) I, II e III estão incorretas.

45) Considerando as características da prática e da integralidade, sob o paradigma da medicina de família e comunidade (MFC), analise as características abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Transcende a prevenção e o tratamento de doenças.
- II. Respeita limites, condições e reais potencialidades tanto no plano individual quanto sociocultural.
- III. Considerar a dimensão psicológica e espiritual.
- IV. Abordar o binômio saúde-doença como processo simples e ao mesmo tempo dinâmico.

Estão corretas:

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II, III e IV.

46) Considerando o paradigma biomédico-cartesiano e o paradigma biopsicossocial da medicina de família e comunidade (MFC), analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

- a) Consumo intenso de tecnologias e procedimentos médicos têm sido observados na Medicina tradicional de paradigma biomédico-cartesiano.
- b) Conceber a mente como processo cerebral separado ou independente do corpo é uma característica do paradigma biomédico-cartesiano.
- c) Na MFC, o médico deve considerar que o modelo biopsicossocial pode excluir a racionalidade anatomoclínica, atuando com a mesma eficiência e eficácia.
- d) Na MFC o médico não deve se concentrar apenas em uma dimensão (psicológica, somática ou social).
- e) Conjunto de manifestações, relacionadas a alterações fisiopatológicas, provocadas por agentes específicos nos órgãos e tecidos corporais são aspectos do conceito de doença sob o paradigma biomédico-cartesiano.

47) Sobre a apendicite aguda, assinale a alternativa incorreta:

- a) A ultrassonografia tem especificidade diagnóstica elevada.
- b) Dor de início súbito, na fossa ilíaca direita e esquerda, e febre alta são as características mais comuns no quadro clínico.
- c) O tratamento cirúrgico é o de escolha.
- d) Hiperestesia na fossa ilíaca direita é um dos sinais de apendicite.
- e) O paciente não apresenta necessariamente parada completa do trânsito intestinal, sendo possível a presença de diarreia.

48) Sobre as hérnias em crianças, assinale a alternativa correta:

- a) A hérnia umbilical não deve necessariamente ser tratada assim que o diagnóstico é realizado.
- b) É incomum se conseguir redução manual incurrenta da hérnia encarcerada.
- c) As hérnias inguinais são mais frequentes no sexo feminino.
- d) A hérnia epigástrica na maioria das vezes não causa sintomas de dor e seu conteúdo sempre pode ser reduzido para a cavidade abdominal.
- e) Após a redução de hérnia encarcerada, a cirurgia deve ser realizada imediatamente.

49) Sobre as ações de Educação em Saúde, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. É importante diversificar esse repertório de ações, incorporando dispositivos de apoio e cooperação horizontal, tais como trocas de experiências e discussão de situações entre trabalhadores, comunidade e outros grupos.
 - II. Um pressuposto da educação permanente em saúde é o planejamento descendente, em que, a partir da análise dos processos de trabalho pelos gestores, identificam-se os nós críticos (de natureza diversa) a serem enfrentados na atenção ou na gestão, possibilitando a construção de estratégias contextualizadas.
 - III. A educação permanente, além da sua dimensão pedagógica, deve ser encarada também como uma importante estratégia de gestão, com grande potencial provocador de mudanças no cotidiano dos serviços.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) I, II e III estão corretas.
 - c) Apenas I está correta.
 - d) Apenas II e III estão corretas.
 - e) I, II e III estão incorretas.

50) Acerca das características do processo de trabalho das equipes de atenção primária à saúde, analise as abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das equipes.
- b) Realizar o acolhimento com escuta qualificada.
- c) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral.
- d) Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
- e) Realizar atenção à saúde fundamentalmente na Unidade de Saúde e no domicílio, desencorajando o uso de locais do território, como escolas, creches, praças outros espaços pouco qualificados.