

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO DE
MÉDICOS NO CORPO DE SAÚDE DA
MARINHA / CP-CSM-MD/2014)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

QUADRO DE MÉDICOS

- 1) Qual é a patologia cirúrgica abdominal mais comum encontrada durante a gravidez?
- (A) Apendicite aguda.
 - (B) Colecistite aguda.
 - (C) Pancreatite biliar.
 - (D) Obstrução intestinal.
 - (E) Diverticulite aguda.
- 2) Amenorreia, anovulação crônica, infertilidade, ganho ponderal e hirsutismo sugerem o diagnóstico de:
- (A) adenomiose.
 - (B) mioma intramural.
 - (C) síndrome de ovários policísticos.
 - (D) doença inflamatória pélvica.
 - (E) vulvovaginite.
- 3) Quanto ao tratamento das fraturas expostas, é correto afirmar que:
- (A) Antibióticoterapia não é necessário.
 - (B) Um litro de soro fisiológico é suficiente para irrigação cirúrgica.
 - (C) Feridas com 1cm não caracterizam exposição óssea.
 - (D) Não se trata de emergência ortopédica.
 - (E) O desbridamento cirúrgico deve ser feito imediatamente.
- 4) A deficiência de ferro é uma das formas mais prevalentes de anemia. Globalmente, 50% das anemias são atribuídas à deficiência de ferro, assim sendo, levando-se em consideração a morfologia dos eritrócitos, como se classifica a anemia ferropriva?
- (A) Normocrômica e microcítica.
 - (B) Hipocrômica e microcítica.
 - (C) Hiperocrômica e microcítica.
 - (D) Hiperocrômica e macrocítica.
 - (E) Hipocrômica e macrocítica.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 5) Qual é o Sinal/sintoma que caracteriza eclâmpsia e que não está presente na pré-eclâmpsia?
- (A) Cefaleia.
 - (B) Hipotensão.
 - (C) Edema.
 - (D) Crise convulsiva.
 - (E) Hipertensão arterial.
- 6) A origem mais comum do abscesso hepático é:
- (A) da veia porta.
 - (B) da artéria hepática.
 - (C) do trauma.
 - (D) da infecção sistêmica.
 - (E) da árvore biliar.
- 7) Sobre a síndrome do cólon irritável, é correto afirmar que:
- (A) é um distúrbio funcional caracterizado por dor, desconforto abdominal e alteração dos hábitos intestinais.
 - (B) o diagnóstico é feito através de marcadores clínicos específicos e, em alguns casos, a biópsia se faz necessária.
 - (C) a síndrome é uma patologia pouco comum na prática clínica e é mais prevalente em homens.
 - (D) a intensidade dos sintomas não costuma ser muito variáveis e, geralmente, afetam a qualidade de vida dos pacientes.
 - (E) os critérios de Roma II descrevem o aspecto da macroscopia das lesões encontrado na coloscopia.
- 8) Qual é o agente etiológico mais comum da pneumonia na criança?
- (A) *Streptococcus pneumoniae*.
 - (B) *Pseudomonas aeruginosa*.
 - (C) *Staphylococcus aureus*.
 - (D) *Escherichia coli*.
 - (E) *Pneumocystis jirovecii*.

- 9) Homem com 30 anos, chega ao serviço de emergência muito ansioso com resultado de alguns exames: Anti-HAV IgG reagente, Anti-HAV IgM não reagente, Anti-HCV não reagente, HbsAg não reagente, Anti-Hbs reagente, Anti-Hbc não reagente e anti-Hbe não reagente. Sendo assim, é correto afirmar que o paciente
- (A) esteve em contato com hepatite A.
 - (B) não foi vacinado para hepatite B.
 - (C) já teve contato com vírus da hepatite C.
 - (D) foi adequadamente vacinado.
 - (E) está em curso de hepetite A.
- 10) A toxemia gravídica caracteriza-se pela tríade:
- (A) hipertensão, edema e proteinúria.
 - (B) edema, poliúria e hipotensão.
 - (C) edema, hipertensão e hiperglicemia.
 - (D) proteinúria, hipertensão e glicosúria.
 - (E) cefaleia, glicosúria e hipertensão.
- 11) Assinale a opção que apresenta um importante fator de risco para câncer de mama.
- (A) História familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau (mãe ou irmã).
 - (B) Diabetes.
 - (C) Hipertensão.
 - (D) Gravidez.
 - (E) Sedentarismo.
- 12) Assinale a opção que apresenta uma indicação de colangiografia intraoperatória.
- (A) Enzimas hepáticas normais.
 - (B) Colédoco fino à imagem pré-operatória, com cálculos grandes na vesícula.
 - (C) Pancreatite biliar com estudo endoscópico do colédoco prévio.
 - (D) Suspeita de lesão intra-operatória das vias biliares.
 - (E) Anatomia bem definida durante a dissecação laparoscópica.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 13) Durante exame físico ginecológico, qual achado sugere o diagnóstico de doença inflamatória pélvica?
- (A) Secreção vaginal fisiológica.
 - (B) Dor à palpação dos órgãos pélvicos.
 - (C) Aumento de volume uterino.
 - (D) Metrorragia intensa.
 - (E) Condiloma.
- 14) O aleitamento materno possui vantagens práticas e psicológicas. Portanto, todas as mães devem ser estimuladas a amamentar seus bebês ao seio. Sobre o tema, assinale a opção correta.
- (A) No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida.
 - (B) Recomenda-se amamentar os bebês, mesmo se a lactante for HIV positiva.
 - (C) O leite humano não contém anticorpos bacterianos e virais.
 - (D) O reinício da menstruação deve desencorajar a continuação da amamentação.
 - (E) O aleitamento materno está associado a uma maior incidência de problemas alimentares relacionados à alergia.
- 15) Pela American Society of Anesthesiology, paciente com doença sistêmica que resulta em debilidade funcional é classificado como ASA:
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
 - (E) V
- 16) Como se denomina a hérnia de parede abdominal que se caracteriza pela protusão de órgão ou tecidos através da linha semilunar ou arqueada de Douglas?
- (A) Spiegel.
 - (B) Femural.
 - (C) Littrè.
 - (D) Deslizamento.
 - (E) Inguinal direta.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 17) Qual é o grau de uma lesão em que a queimadura atinge a epiderme e a derme?
- (A) Primeiro.
 - (B) Segundo.
 - (C) Terceiro.
 - (D) Quarto.
 - (E) Quinto.
- 18) A disparidade em pulsação e pressão arterial nos braços e pernas associada a pulsos femorais fracos (ou ausentes em até 40% dos pacientes) em contraste com os pulsos latejantes dos vasos dos braços e carótida, em recém-nascido, possibilita a hipótese diagnóstica de:
- (A) subluxação congênita de quadril.
 - (B) coarctação da aorta.
 - (C) tetralogia de Fallot.
 - (D) comunicação interatrial.
 - (E) paralisia infantil.
- 19) A convulsão febril simples é a condição epiléptica mais comum da infância. Sobre ela, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Ocorre independentemente da idade da criança, sendo mais comum entre os maiores de 9 anos.
 - (B) Antecedentes familiares positivos de crises febris em irmãos e nos pais sugerem predisposição genética.
 - (C) Geralmente se associa a um nível de temperatura que aumenta rapidamente até 39°C ou mais.
 - (D) O estado de mal epiléptico costuma ser causado por infecção do sistema nervoso central.
 - (E) A conduta de rotina para um lactente normal com crises convulsivas febris simples e breves inclui pesquisa cuidadosa da causa da febre e tranquilização e orientação dos pais.
- 20) Culdocentese é o procedimento caracterizado pela punção:
- (A) de abscesso mamário.
 - (B) de cisto mamário.
 - (C) da cavidade amniótica.
 - (D) do fígado.
 - (E) do fundo de saco de Douglas.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 21) Sobre luxações, assinale a opção correta.
- (A) A luxação simples do ombro geralmente necessita de redução aberta.
 - (B) A luxação do cotovelo é a mais rara de ocorrer.
 - (C) A luxação do joelho pode estar associada à lesão da artéria poplítea.
 - (D) Geralmente, a patela luxa medialmente.
 - (E) A luxação do quadril não constitui emergência ortopédica.
- 22) O teste imunológico para diagnóstico da gravidez detecta a excreção de:
- (A) estradiol.
 - (B) progesterona.
 - (C) ocitocina.
 - (D) gonadotrofina coriônica humana.
 - (E) testosterona.
- 23) Com relação à terapia oral para Diabetes, assinale a opção INCORRETA.
- (A) A acarbose diminui a absorção da glicose e auxilia na redução da glicemia pós prandial.
 - (B) As sulfonilureias têm como mecanismo de ação o aumento da secreção de insulina. Sendo assim a hipoglicemia é um efeito colateral raro.
 - (C) A metformina reduz a produção de glicose hepática e frequentemente está relacionada à perda de peso e à intolerância gástrica.
 - (D) As tiazolinedionas reduzem a resistência à insulina e têm como contraindicação doença hepática e insuficiência cardíaca.
 - (E) As sulfonilureias de segunda e terceira geração são drogas mais seguras com menos chance de efeitos colaterais.
- 24) A vacina anti-Rh está indicada no pós-parto para prevenção da doença hemolítica perinatal nos casos de:
- (A) mãe Rh positivo e RN Rh positivo.
 - (B) mãe Rh positivo e RN Rh negativo.
 - (C) mãe Rh negativo e RN Rh negativo.
 - (D) mãe Rh negativo e RN Rh positivo.
 - (E) mãe Rh positivo e RN Rh positivo ou negativo.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 25) Com relação à bronquiolite aguda, é correto afirmar que:
- (A) sempre se deve internar lactentes portadores de bronquiolite aguda.
 - (B) é comumente causada por agentes não-virais.
 - (C) é mais comum em lactentes amamentados ao seio materno.
 - (D) deve ser tratada com corticoide sistêmico.
 - (E) o vírus sincicial respiratório é responsável por mais de 50% dos casos.
- 26) A avaliação inicial do paciente com escoliose idiopática do adolescente deve incluir:
- (A) ressonância magnética.
 - (B) provas reumatológicas.
 - (C) cintilografia óssea.
 - (D) exame físico e neurológico completo.
 - (E) eletroneuromiografia.
- 27) Qual das opções abaixo apresenta indicação para realização de tomografia computadorizada de abdome no trauma?
- (A) Clara indicação para laparotomia.
 - (B) Instabilidade hemodinâmica.
 - (C) Trauma abdominal fechado, com paciente estável.
 - (D) Agitação.
 - (E) Alergia ao meio de contraste.
- 28) Criança com 10 anos de idade, portadora de leucemia mieloide aguda, encontra-se internada em uma enfermaria de oncologia pediátrica. Iniciou febre há 3 dias, quando surgiram vesículas em membros e tronco, sugestivas de varicela. Qual a conduta a ser adotada nas demais crianças internadas nessa enfermaria?
- (A) Observar, pois já foram passadas 72 horas de contato.
 - (B) Aplicar a vacina antivaricela.
 - (C) Aplicar a imunoglobulina antivaricela.
 - (D) Aplicar a vacina e a imunoglobulina antivaricela.
 - (E) Dar alta para as demais crianças.

- 29) Qual substância é formalmente contraindicada durante a gestação?
- (A) Talidomida.
 - (B) Dipirona.
 - (C) Amoxicilina.
 - (D) Paracetamol.
 - (E) Ácido fólico.
- 30) De todas as características visíveis da membrana timpânica, qual das abaixo citadas é a mais sensível e específica para determinar o diagnóstico de Otite Média Aguda?
- (A) Aumento da vascularização.
 - (B) Mobilidade / abaulamento.
 - (C) Perda do triângulo luminoso.
 - (D) Hiperemia.
 - (E) Opacidade.
- 31) Assinale a opção que apresenta uma complicação tardia após fratura supracondilar de úmero em crianças.
- (A) Neuropraxia.
 - (B) Síndrome compartimental.
 - (C) Infecção.
 - (D) Cúbito varo.
 - (E) Luxação acrômioclavicular.
- 32) São fatores de risco para fratura osteoporótica, EXCETO:
- (A) baixo peso.
 - (B) cor branca.
 - (C) fratura prévia na idade adulta.
 - (D) tabagismo.
 - (E) atividade física.
- 33) A síndrome nefrótica é essencialmente uma doença pediátrica, sendo 15 vezes mais comum em crianças que em adultos. Os aspectos característicos da síndrome nefrótica são:
- (A) hipertensão arterial, edema, hiperglicemia.
 - (B) hipercalcemia, hiperglicemia, hipertensão arterial.
 - (C) edema, hipocalemia, hipertensão arterial.
 - (D) hipotensão arterial, proteinúria, hiperglicemia.
 - (E) edema, hiperlipidemia, hipoalbuminemia.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 34) Com relação à osteomielite aguda hematogênica, é INCORRETO afirmar que:
- (A) a contagem de leucócitos muitas vezes é normal.
 - (B) abscessos sequestrados exigem drenagem cirúrgica.
 - (C) é o tipo mais comum de infecção óssea.
 - (D) estreptococcus grupo B é o organismo infectante mais provável em adultos.
 - (E) em crianças com menos de 2 anos, alguns vasos sanguíneos cruzam a fise e podem disseminar infecção para epífese.
- 35) Sobre a Doença de Parkinson, é correto afirmar que:
- (A) as alterações cognitivas acontecem antes das alterações motoras.
 - (B) a depressão não está comumente associada à doença.
 - (C) o diagnóstico é estabelecido a partir de marcadores específicos.
 - (D) as manifestações clínicas mais comuns são: bradicinesia, tremor em repouso, rigidez e alteração de marcha.
 - (E) o tratamento deve ser instituído precocemente e nunca deve ser feito em monoterapia.
- 36) Qual a técnica de cirurgia bariátrica em que o mecanismo de ação é amplamente restritivo com má absorção discreta?
- (A) Desvio pancreático.
 - (B) Derivação gástrica em y de Roux.
 - (C) Exclusão duodenal.
 - (D) Gastroplastia vertical em banda.
 - (E) Colocação de banda gástrica ajustável laparoscópica.
- 37) Com relação às fraturas do quadril, assinale a opção correta.
- (A) Fratura do colo do fêmur é mais comum em homens.
 - (B) O estágio I de Garden representa a fratura completa.
 - (C) Artroplastia é o único método de tratamento.
 - (D) Na fratura do colo do fêmur, o tratamento cirúrgico deve ser feito assim que possível.
 - (E) Nos pacientes jovens, estão associadas à trauma de baixa energia.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 38) A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma patologia de alta prevalência e de íntima relação com o hábito do tabagismo, sendo caracterizada por hiperreatividade das vias aéreas e por períodos de estabilidade e exacerbações. O período de exacerbação é marcado por:
- (A) febre, piora da dispneia e melhora da tosse.
 - (B) Inapetência, piora da tosse e ausência de secreção.
 - (C) aumento da secreção, secreção clara e fluida, além de anorexia.
 - (D) anorexia, melhora da dispneia e aumento da tosse.
 - (E) piora da tosse e da dispneia, além de aumento do volume da secreção.
- 39) Mulher com 60 anos, sabidamente hipertensa, em uso de losartan 50mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25mg pela manhã, anlodipino 5mg 2 vezes ao dia, carbonato de cálcio 600mg 2 vezes ao dia e clonazepam 1mg à noite, procura serviço de emergência com queixa de edema de membros inferiores. Esse edema provavelmente está relacionado ao uso de qual medicação?
- (A) Losartan.
 - (B) Anlodipino.
 - (C) Clonazepan.
 - (D) Carbonato de cálcio.
 - (E) Hidroclorotiazida.
- 40) Mulher com 45 anos chega à emergência de um hospital terciário, acompanhada pelo esposo, com relato de perda súbita de consciência, precedida de uma cefaleia referida como "a pior dor de cabeça da vida". O exame físico não demonstrou déficit focal. A conduta a ser adotada é:
- (A) realizar imediatamente punção lombar e iniciar antibiótico de amplo espectro.
 - (B) realizar Tomografia de crânio e encaminhar para vigilância neurológica no CTI.
 - (C) realizar analgesia com dipirona e liberar com orientação de procurar neurologista.
 - (D) solicitar exames laboratoriais para afastar a possibilidade de meningite.
 - (E) fazer ressonância nuclear magnética de crânio e aguardar especialista.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 41) Com relação aos tumores malignos do reto, qual é o mais frequente?
- (A) Sarcoma.
 - (B) Adenocarcinoma.
 - (C) Linfoma.
 - (D) Carcinóide.
 - (E) Melanoma.
- 42) A discopatia cervical tem indicação cirúrgica quando o paciente:
- (A) apresenta melhora com tratamento conservador.
 - (B) tem déficit neurológico progressivo.
 - (C) queixa-se de cefaleia.
 - (D) apresenta alteração de reflexo patelar.
 - (E) não tiver resposta com a tração cervical.
- 43) Com relação à lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, é correto afirmar que:
- (A) o tratamento conservador é uma opção.
 - (B) a punção articular tem que ser feita imediatamente.
 - (C) as mulheres são mais acometidas que os homens.
 - (D) crianças não apresentam esse tipo de lesão.
 - (E) é mais rara que a lesão do ligamento cruzado posterior.
- 44) Paciente de 25 anos, sexo masculino, com dor progressiva em topografia de fêmur distal, apresentando nas radiografias da região lesão agressiva, mal definida, metafisária com reação periosteal. Assinale a opção que apresenta o provável diagnóstico.
- (A) Fratura por estresse.
 - (B) Osteossarcoma.
 - (C) Doença de Paget.
 - (D) Mieloma múltiplo.
 - (E) Cisto de Baker.
- 45) A maioria dos corpos estranhos nas vias aéreas se aloja:
- (A) no Brônquio esquerdo.
 - (B) nas narinas.
 - (C) na laringe.
 - (D) na traqueia.
 - (E) no Brônquio direito.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14

- 46) Com relação ao manuseio de um paciente vítima de acidente automobilístico com lesão do anel pélvico, é correto afirmar que:
- (A) devem ser tomadas todas as medidas dos protocolos traumatológicos existentes.
 - (B) a tomografia deve ser feita antes mesmo de realizar radiografias.
 - (C) em pacientes com instabilidade hemodinâmica, é indicada observação por 24hs.
 - (D) não é necessário realizar exames vaginal e retal em pacientes com fratura exposta de bacia.
 - (E) imediatamente após a lesão, a mortalidade é decorrente de falência de múltiplos órgãos.
- 47) Qual é a neoplasia abdominal mais comum em crianças?
- (A) Neuroblastoma.
 - (B) Tumor de Wilms.
 - (C) Rabdomiossarcoma.
 - (D) Hepatoblastoma.
 - (E) Teratoma.
- 48) Qual manifestação clínica é mais consistente para classificar uma criança como portadora de pneumonia?
- (A) Sibilância.
 - (B) Aumento da frequência respiratória.
 - (C) Estridor.
 - (D) Tiragem subcostal.
 - (E) Tosse.
- 49) Qual vírus está diretamente relacionado ao câncer de colo uterino?
- (A) CMV.
 - (B) H1N1.
 - (C) HPV.
 - (D) HTLV 1 e 2.
 - (E) HIV.

50) A nefrite lúpica é uma das manifestações do lúpus eritematoso sistêmico. Qual é o anticorpo que está fortemente relacionado à nefrite?

- (A) Anticardiolipina.
- (B) Anti-DNA.
- (C) Anti-SSA (RO).
- (D) Anti-SM.
- (E) Anti-P.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/14