



**COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA**

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2003

**PROVA DE ENFERMAGEM
CÓDIGO 20 - VERSÃO A**

ATENÇÃO: ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM.

DATA DE APLICAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2003.

PREENCHA OS DADOS ABAIXO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO Nº: _____

LEIA COM ATENÇÃO:

- 1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA ESTÁ COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEIS;
- 2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO CARTÃO-RESPOSTA;
- 3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO CARTÃO-RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL;
- 4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO PARA ASSINATURA;
- 5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 (DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E
- 6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA METADE DO TEMPO PREVISTO.

BOA PROVA!

- 01 - A Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências, sendo que **NÃO** compete ao Conselho Federal de Enfermagem,
- instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão.
 - elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário.
 - conhecer e decidir assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis.
 - aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes.
- 02 - O propósito de um Código de Ética é
- estabelecer as bases das associações nacionais de enfermagem.
 - orientar os enfermeiros nas escolhas morais que ocorrem na prática de enfermagem.
 - fornecer medidas disciplinares contra os enfermeiros que não o aceitam.
 - identificar valores e atitudes adequadas à profissão do enfermeiro.
- 03 - Assinale a alternativa que explica como fica afetado o equilíbrio hídrico durante as primeiras 24 a 48 horas do pós-operatório.
- O líquido move-se para o espaço intersticial, a partir do sistema vascular, por osmose.
 - O líquido move-se para o sistema vascular a partir do espaço intersticial.
 - A pressão osmótica do sangue se eleva.
 - A perda de líquidos geralmente excede a ingesta.
- 04 - Assinale a alternativa que apresenta a estrutura na qual o centro de controle das atividades respiratória e cardiovascular está localizado.
- Córtex cerebral.
 - Bulbo.
 - Hipotálamo.
 - Medula óssea.
- 05 - Ao aferir a pressão diastólica ocorre, na artéria, um evento. Assinale-o.
- A artéria está completamente ocluída.
 - A artéria abre-se durante a sístole e a diástole, mas permanece parcialmente em constrição.
 - A artéria começa a abrir-se no auge da sístole.
 - A artéria não sofre restrições em seu fluxo sanguíneo durante a pressão exercida pelo manguito.
- 06 - Considerando-se as diferenças entre a tristeza e a depressão, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, sabendo-se que os números da 1ª coluna podem se repetir na segunda.
- Tristeza.
 - Depressão.
- Reação à perda real de um objeto de grande valor que pode ser tangível ou intangível.
 - Trata-se de uma perturbação profunda no humor.
 - Reação à perda real, ameaçada ou imaginada, de um objeto de grande valor.
 - É autolimitada e diminui gradualmente em duração num período de cerca de um ano.
- A seqüência correta é
- 1, 2, 2, 2.
 - 2, 2, 1, 1.
 - 2, 1, 1, 2.
 - 1, 2, 2, 1.
- 07 - Relacione as doenças sexualmente transmissíveis às suas respectivas classificações.
- Sífilis, cancro mole.
 - Tricomoniase, hepatite B.
 - Schiguelose, pediculose pubiana.
- Doenças **essencialmente** transmitidas pelo contato sexual.
 - Doenças **frequentemente** transmitidas pelo contato sexual.
 - Doenças **eventualmente** transmitidas pelo contato sexual.
- A seqüência correta é
- 2, 3, 1.
 - 1, 2, 3.
 - 3, 1, 2.
 - 2, 1, 3.
- 08 - A eclosão da doença pode resultar por casos importados; o doente, atualmente presente na área sob consideração, adquiriu o seu mal em outra região, de onde emigrou.
- A definição acima refere-se a
- casos autóctones.
 - surtos epidêmicos.
 - casos alóctones.
 - endemia.
- 09 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando as doenças aos seus respectivos agentes causadores.
- Calymmatobacterium granulomatis*.
 - Papovavírus*.
 - Treponema pallidum*.
 - Haemophilus vaginalis*.
 - Chlamydia trachomatis*.
- Vaginite.
 - Donovanose.
 - Linfogranuloma venéreo.
 - Condiloma acuminado.
 - Sífilis
- A seqüência correta é
- 1, 5, 3, 2, 4.
 - 5, 3, 4, 1, 2.
 - 4, 1, 5, 2, 3.
 - 2, 5, 4, 1, 3.

10 - A Vigilância Epidemiológica é um sistema de informação, decisão e ação, para recomendar, planejar e avaliar medidas de controle dos agravos.

Com relação aos níveis das ações de enfermagem na epidemiologia, marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) e, a seguir, assinale a alternativa correspondente.

- () Educação contínua e permanente dos funcionários responsáveis pela vigilância epidemiológica, a fim de melhorar a qualidade de diagnóstico e agir prontamente com medidas preventivas é uma ação de enfermagem ao nível de prevenção primária.
- () Prestação de serviços em hospitais e na comunidade para redução de incapacidades é uma ação de enfermagem ao nível de prevenção terciária.
- () Educação para a saúde: através de palestras, cursos, grupos, atividades em escolas, creches, associações de bairro, etc é uma ação de enfermagem ao nível de prevenção primária.
- () Prevenção da disseminação dos agentes infecciosos, através de medidas como precauções universais, quimioprofilaxia e exames laboratoriais adequados é uma ação de enfermagem ao nível de prevenção terciária.

- a) V, V, V, V.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, V, V, F.

11 - O sexo ainda é um assunto cercado de tabus e preconceitos. Por maiores que sejam a evolução dos costumes e a divulgação em torno da sexualidade pelos meios de comunicação, ser portador de uma doença sexualmente transmissível (DST) implica medo, culpa, ansiedade e angústia. Torna-se necessário o esclarecimento de informações básicas sobre as DST para a população em geral.

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os níveis de prevenção às respectivas ações de enfermagem.

- 1 – Nível Primário.
- 2 – Nível Secundário.
- 3 – Nível Terciário.

- () Informação à população-alvo em mensagens simples que esclareçam dúvidas combatendo os preconceitos e credices sobre o assunto DST.
- () Reintegração, à família, de um paciente portador de DST, por exemplo, AIDS.
- () Notificação dos casos existentes, pelos profissionais de saúde, objetivando processar a vigilância epidemiológica.

A seqüência correta é

- a) 1, 3, 2.
- b) 3, 2, 1.
- c) 2, 1, 3.
- d) 1, 2, 3.

12 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a alternativa correspondente.

- 1 – Fitonoses.
- 2 – Epizootia.
- 3 – Enzoootia.
- 4 – Zooantroponoses.

- () Doenças adquiridas pelos animais a partir do homem, ou seja, a fonte é animal.
- () Nome que equivale ao de endemia, porém aplicado à população animal.
- () Nome equivalente ao de epidemia, porém aplicado à população animal.
- () Doenças comuns ao homem e aos vegetais, sendo adquiridas pelo primeiro quando em contato com os últimos.

- a) 4, 3, 2, 1.
- b) 1, 2, 3, 4.
- c) 3, 2, 4, 1.
- d) 4, 3, 1, 2.

13 - Em relação à vacina contra hepatite B, todas as afirmativas abaixo são corretas, **EXCETO**:

- a) a gravidez não é contra-indicação.
- b) é indicada a partir do nascimento.
- c) pode ser aplicada em pessoas com doença febril.
- d) pode ser administrada por via intramuscular ou subcutânea.

14 - Gotículas de Wells estão relacionadas à transmissão da

- a) Coqueluche.
- b) Difteria.
- c) Varicela.
- d) Tuberculose.

15 - Assinale a alternativa que apresenta a correta definição de ROTINA.

- a) Um ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem.
- b) Um conjunto de regras ou instruções para fixar os procedimentos, métodos e organização, que serão utilizados no desenvolvimento das atividades. São princípios de ação.
- c) A descrição detalhada e seqüencial de como uma atividade deve ser realizada. É sinônimo de técnica; geralmente é uniforme para toda a organização, pois está baseada em princípios científicos.
- d) O conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. Instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde.

16 - Marque **V** para verdadeiro ou **F** para falso.

- () Segundo o Ministério da Saúde, a "supervisão é um processo educativo e contínuo que consiste, fundamentalmente, em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos serviços prestados".
- () A principal tarefa da seleção de pessoal é proceder a confrontação entre informações fornecidas pelo candidato e os pré-requisitos determinados e decidir sobre qual o indivíduo que melhor se adapte ao tipo de trabalho a ser desempenhado.
- () A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua "educação continuada" como o "processo que inclui experiências posteriores ao adestramento inicial, as quais ajudam o pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho".
- () Os tipos de comunicação dentro de uma organização de saúde variam de acordo com os instrumentos e o seu fluxo. Podem ser, unicamente: comunicação ascendente, comunicação descendente e comunicação diagonal.
- () A passagem de plantão é um importante meio de comunicação, pois além do relato sobre o paciente para a equipe, dando uma idéia geral da situação, pode ser o momento de informar e orientar o funcionário e de, juntos, planejarem a assistência de enfermagem. É um tipo de comunicação ascendente.

A seqüência correta é

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, V, V, F, F.
- c) F, V, F, V, V.
- d) F, F, F, V, V.

17 - Planejamento da assistência de enfermagem é a determinação das ações de enfermagem pela utilização de um método de trabalho, a fim de atender às necessidades da clientela. Esse planejamento pode ser compreendido em três amplitudes: estratégico, tático e operacional.

Com base na afirmativa acima, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1ª coluna

- 1 – Planejamento estratégico.
- 2 – Planejamento tático.
- 3 – Planejamento operacional.

2ª coluna

- () É um plano de curto alcance que corresponde ao planejamento da assistência, utilizando um método para cada paciente ou grupos específicos de clientes.
- () É um plano de longo alcance que corresponde ao planejamento para a implementação de um método de assistência de enfermagem ao nível institucional.
- () É um plano de médio alcance, que corresponde à adaptação do método de assistência para cada unidade de serviço de enfermagem, respeitando suas especialidades.

A seqüência correta é

- a) 3, 1, 2.
- b) 1, 2, 3.
- c) 2, 3, 1.
- d) 1, 3, 2.

18 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a alternativa correspondente.

- 1 – Teoria Burocrática.
- 2 – Teoria Científica.
- 3 – Teoria das Relações Humanas.
- 4 – Teoria Clássica.

- () No início da década de 1930, surge nos Estados Unidos uma teoria que, entre outros fatores, foi determinada pelas necessidades de humanização e democratização na administração de pessoal e pelo desenvolvimento das chamadas ciências humanas (psicologia e sociologia). A administração passou a tratar, entre outros, de temas relativos à motivação humana, à liderança, à comunicação e à dinâmica de grupo.
- () Teoria cuja proposta básica era o aumento da produção pela eficiência do nível operacional. Essa teoria preconizava a divisão do trabalho, a especialização do operário e a padronização das atividades e tarefas por ele desenvolvidas. Outro aspecto valorizado era o incentivo salarial e o prêmio compatível à produção.
- () Essa teoria visava à eficiência da organização pela adoção de estrutura adequada e de um funcionamento compatível com essa estrutura. A preocupação não era com a divisão do trabalho ao nível individual, mas sim com a divisão ao nível dos órgãos integrantes da organização.
- () Essa teoria visa à eficiência organizacional como objetivo básico e, para tanto, detalha pormenorizadamente como as coisas deverão ser feitas, ou seja, prevê em detalhes o funcionamento organizacional. Caracteriza-se ainda pela impessoalidade nas relações humanas, considerando os indivíduos apenas em função dos cargos e funções que exercem na organização.

- a) 4, 2, 3, 1.
- b) 3, 4, 1, 2.
- c) 3, 2, 4, 1.
- d) 2, 1, 4, 3.

19 - A avaliação sistemática e formal de uma atividade realizada por alguém que não esteja envolvido diretamente na sua execução, com o intuito de determinar se essa atividade está sendo levada a efeito de acordo com seus objetivos é definida como auditoria.

Com relação à classificação das auditorias, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- 1 – Quanto à forma de intervenção.
- 2 – Quanto ao tempo.
- 3 – Quanto à natureza.
- 4 – Quanto ao limite.

- () Auditoria normal / Auditoria específica.
- () Auditoria interna / Auditoria externa.
- () Auditoria total / Auditoria parcial.
- () Auditoria contínua / Auditoria periódica.

A seqüência correta é

- a) 3, 1, 4, 2.
- b) 1, 2, 4, 3.
- c) 4, 3, 2, 1.
- d) 2, 4, 3, 1.

20 - São hormônios secretados pela hipófise e regulam a atividade ovariana:

- a) FSH e LH.
- b) corpo lúteo e estrogênio.
- c) prolactina e progesterona.
- d) estrogênio e progesterona.

- 21 - A enfermeira, na consulta de enfermagem no pré-natal, ao encontrar uma leucocitose, deverá suspeitar de uma possível infecção a partir da seguinte contagem:
- 10.000/mm³
 - 12.000/mm³
 - 15.000/mm³
 - 18.000/mm³
- 22 - Durante a gestação, há um aumento dos fatores de coagulação e do fibrinogênio. Isso ocorre para
- diminuir o risco de embolia.
 - facilitar a involução uterina.
 - diminuir o risco de trombose.
 - aumentar a hemostasia no puerpério.
- 23 - No segundo período do parto, ocorre(m) o/a
- apagamento e a dilatação.
 - período de recuperação.
 - nascimento da criança.
 - expulsão da placenta.
- 24 - São drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial na gravidez, **EXCETO**:
- Hidralazina.
 - Furosemida.
 - Metildopa.
 - Nifedipina.
- 25 - No caso da pré-eclâmpsia e administração de sulfato de magnésio, a enfermeira deve estar atenta para o aparecimento de
- hiper-reflexia.
 - taquicardia.
 - bradicardia.
 - oligúria.
- 26 - Assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo.
- A maior fonte de produção de líquido amniótico vem do(s) _____ do concepto.
- rins
 - pulmões
 - fígado
 - aparelho gastrointestinal
- 27 - O fígado de uma criança, após o nascimento, tem uma capacidade diminuída de realizar a função de, **EXCETO**
- regular a glicose, por isso a hipoglicemia é comum.
 - evitar o eritema tóxico.
 - conjugar a bilirrubina para que possa ser excretada.
 - produzir protrombina, por isso menos vitamina K é produzida.
- 28 - Marque **V** para a assertiva verdadeira e **F** para a falsa e, a seguir, assinale a alternativa correta.
- () O leite materno contém mais lactalbumina que o leite de vaca, aumentando a formação de coalhos no intestino da criança.
- () A gordura do leite materno é mais fácil de digerir e absorver do que a do leite de vaca.
- () O conteúdo de ferro é alto no leite materno.
- F, F, V
 - V, F, V
 - F, V, F
 - V, V, V
- 29 - Sabe-se que a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção das drogas diferem substancialmente nas crianças e que estas reagem mais rápida e violentamente às medicações. São múltiplos os fatores que modificam a ação das drogas nos recém-nascidos. Com relação a esses fatores, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Imaturidade do metabolismo hepático.
 - Aumento da permeabilidade da pele e da conjuntiva.
 - Hipoplasia no crescimento tecidual.
 - Diminuição da função renal.
- 30 - Correlacione a 2ª coluna com a 1ª.
- 1 – Choque hipovolêmico.
2 – Choque cardiogênico.
3 – Choque distributivo.
- () Ocorre quando há uma má distribuição do volume de sangue no sistema vascular.
- () Ocorre quando existe uma diminuição do volume intravascular.
- () Ocorre quando o coração não consegue desempenhar bem sua função bombeadora.
- Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
- 3, 1, 2
 - 1, 3, 2
 - 2, 1, 3
 - 1, 2, 3
- 31 - A ausência ou a insuficiência da peristalse do esôfago distal, acompanhada da falência do esfíncter esofágico em relaxar em resposta à deglutição, é denominada
- acalasia.
 - policitemia.
 - epistaxe.
 - ambliopia.
- 32 - A sonda de Sengstaken-Blakemore é um instrumento utilizado com a finalidade de controlar o sangramento esofágico. Esse procedimento exige do enfermeiro conhecimento e experiência para detectar sinais e sintomas de complicações. São consideradas complicações potenciais do uso dessa sonda, **EXCETO** a
- ulceração e necrose da mucosa do estômago e esôfago.
 - asfixia.
 - lesão pilórica por pressão excessiva.
 - aspiração de sangue e secreções para os pulmões.

33 - Os sons respiratórios normais ouvidos sobre a periferia do pulmão é/são denominado(s)

- a) murmúrio vesicular.
- b) sons brônquicos.
- c) estertores altos.
- d) sons broncovesiculares.

34 - A respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada por/pela

- a) respiração com uma pausa longa em inspiração completa ou expiração completa.
- b) respiração totalmente irregular com respirações profundas e superficiais com pausas irregulares.
- c) respirações entrecortadas com pausas irregulares.
- d) profundidade da respiração aumentando até um pico e a seguir diminuindo até um período de apnéia.

35 - O *Delirium Tremens* por abstinência de álcool é grave e tem elevado índice de mortalidade. Assinale a alternativa correta com relação à assistência ao cliente.

- a) Deverá ser mantido em enfermaria para melhor observação.
- b) Deverá ser mantido em quarto privativo e pouco iluminado.
- c) Deverá ser mantido contido para evitar agressões.
- d) O acompanhante não é importante.

36 - A administração de sangue e hemoderivados demanda conhecimentos das corretas técnicas de administração e das possíveis complicações. Quando há suspeita de que uma reação transfusional está ocorrendo, além de interromper a transfusão e comunicar imediatamente ao médico, alguns passos são dados de forma que o diagnóstico seja feito de acordo com o tipo e a gravidade da reação. Com relação à conduta correta, marque **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Interromper a transfusão, retirar a punção venosa, repuncionar outra veia e deixá-la permeável.
- () A bolsa com o sangue e o equipo de soro não devem ser desprezados.
- () A bolsa de sangue pode ser desprezada após a verificação das etiquetas de identificação e do número da bolsa.
- () O sangue do paciente deve ser colhido para exame de hemoglobina plasmática, cultura e nova tipagem.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.

- a) V, F, V, F
- b) V, V, F, F
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, V

37 - Dentre as complicações da insuficiência hepática, a que está relacionada com o metabolismo da amônia é a

- a) síndrome hepatorenal.
- b) encefalopatia hepática.
- c) ascite.
- d) hepatite.

38 - Em relação à heparinização durante a hemodiálise, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O objetivo principal de qualquer método de heparinização é impedir a coagulação no dialisador.
- b) A protamina pode ser usada para reverter os efeitos da heparina.
- c) Pode-se utilizar qualquer quantidade de heparina, enquanto o enfermeiro estiver monitorizando os tempos de coagulação ativados.
- d) Pode-se usar pouca ou nenhuma heparina para o paciente que tem distúrbios subjacentes de fatores da coagulação.

39 - Assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo.

A hemoglobina glicosilada é um teste sangüíneo que reflete a média dos níveis de glicose sangüínea num período de, aproximadamente, _____ dias.

- a) 15
- b) 45
- c) 90
- d) 120

40 - Existem vários tipos de incontinência urinária. A que está relacionada à deficiência cognitiva grave, por exemplo a demência de Alzheimer, é a incontinência

- a) de esforço.
- b) funcional.
- c) de hiperfluxo.
- d) de urgência.

