



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE
ANESTESIOLOGIA**

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 02

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

5 Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

10 Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

15 Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo 20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

25 Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

30 Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um 35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelas laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ **Conhecimentos Especializados**

Questão 16

Considerando-se os exames rotineiros no preparo pré-operatório de pacientes jovens assintomáticos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a hemoglobina de 7g/dl é aceitável em pacientes sem doença sistêmica.
- B) o eletrocardiograma (ECG) é indispensável em pacientes submetidos a cirurgia ambulatorial.
- C) os eletrólitos necessitam ser dosados rotineiramente.
- D) os estudos de coagulação não são medidos rotineiramente.

Questão 17

É **INCORRETO** afirmar que, entre os responsáveis por aumento na degradação de sevoflurano em composto A, se inclui

- A) as concentrações mais elevadas de sevoflurano no circuito anestésico.
- B) as técnicas anestésicas de baixo fluxo.
- C) as temperaturas mais altas do absorvente de CO₂.
- D) os absorventes de CO₂ saturados.

Questão 18

Considerando-se a monitorização peroperatória do paciente anestesiado, é **CORRETO** afirmar que

- A) a temperatura central pode ser medida em nasofaringe, sangue, esôfago, bexiga ou reto.
- B) o Índice Bi-Spectral (BIS) é um confiável monitor da resposta a estímulos nocivos.
- C) os pacientes portadores de enfisema pulmonar apresentam redução da diferença entre a PaCO₂ e a ETCO₂.
- D) os pacientes portadores de níveis elevados de carboxiemoglobina apresentam saturação de oxigênio falsamente reduzida.

Questão 19

Considerando-se as complicações do posicionamento do paciente no período operatório, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a lesão do nervo ciático decorre de o paciente ser submetido a cirurgia em posição assentada.
- B) a lesão do nervo supraescapular decorre do posicionamento do paciente em decúbito lateral.
- C) a neuropatia de membro inferior decorre do posicionamento prolongado do paciente em litotomia.
- D) a neuropatia do nervo ulnar decorre da hiperextensão do braço durante decúbito dorsal.

Questão 20

Considerando-se os fatores que alteram a concentração alveolar mínima (CAM) dos anestésicos inalatórios, é **CORRETO** afirmar que

- A) a administração aguda de etanol eleva a CAM.
- B) a gravidez reduz a CAM.
- C) a hiponatremia eleva a CAM.
- D) os níveis elevados de neurotransmissores do sistema nervoso central reduzem a CAM.

Questão 21

Considerando-se os anestésicos venosos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a cetamina tem propriedades estimulantes miocárdicas intrínsecas.
- B) o etomidato está associado a um aumento na incidência de vômitos.
- C) o propofol pode induzir mioclonia não-epiléptica durante a indução.
- D) o tiopental precipita quando adicionado ao *ringer* com lactato.

Questão 22

É **INCORRETO** afirmar que, entre os fatores que contribuem para uma menor incidência pós-operatória de cefaléia pós-punção da *dura mater*, se inclui

- A) a agulha de ponta não-cortante.
- B) a permanência na posição supina.
- C) o bisel da agulha paralelo ao maior eixo das meninges.
- D) o menor calibre da agulha.

Questão 23

Considerando-se o equilíbrio hidroeletrolítico, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a correção rápida da hiponatremia pode levar à síndrome da desmielinização osmótica.
- B) a hipermagnesemia prolonga a duração de ação dos agentes bloqueadores neuromusculares não-despolarizantes.
- C) a hipocalcemia pode resultar de quelação após múltiplas hemotransfusões.
- D) as cirurgias da hipófise podem levar a hiponatremia, devido ao diabetes *insipidus*.

Questão 24

É **INCORRETO** afirmar que, entre os efeitos hemodinâmicos do pneumoperitônio, se inclui o aumento

- A) da pressão arterial média.
- B) da pressão de oclusão da artéria pulmonar.
- C) da pressão venosa central.
- D) do índice cardíaco.

Questão 25

Considerando-se a anestesia para neurocirurgia, é **INCORRETO** afirmar que

- A) halotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevoflurano têm efeito vasodilatador direto, que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral.
- B) hiperventilação com hipocapnia deve ser iniciada para o controle de pacientes com hipertensão intracraniana.
- C) hipotermia leve (32°C a 34°C) é recomendada, durante anestesia para aneurisma, para aumentar a tolerância do encéfalo à isquemia.
- D) hipovolemia, hipotensão induzida e hemodiluição (triplo H) constituem a terapia para o vasoespasm cerebral.

Questão 26

É **INCORRETO** afirmar que, entre as indicações absolutas para ventilação monopulmonar, se inclui

- A) a fístula broncopleurale.
- B) a toracoscopia videoassistida.
- C) o abscesso pulmonar.
- D) o reparo de aneurisma de aorta torácica.

Questão 27

Considerando-se a anestesia para cirurgia vascular, é **CORRETO** afirmar que

- A) a administração de heparina de baixo peso molecular, após cirurgia de revascularização de MMII, deve aguardar duas horas após retirada do cateter do neuroeixo.
- B) a manutenção de hipercarbia, durante cirurgia de endarterectomia de carótida, induz vasodilatação e melhora a perfusão cerebral em áreas isquêmicas.
- C) a realização de anestesia regional para cirurgia vascular periférica leva à redução da perfusão do enxerto.
- D) o uso óxido nítrico, durante cirurgia de reconstrução de aorta, mantém inalteradas a pós-carga e a *performance* inotrópica miocárdica.

Questão 28

Considerando-se a anestesia em Obstetrícia, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a analgesia epidural para o primeiro estágio do trabalho de parto deve bloquear os dermatômeros de T10 a L1.
- B) a analgesia epidural para o trabalho de parto de pacientes com estenose aórtica sintomática deve ser acompanhada de monitorização invasiva.
- C) a hiperventilação deve ser evitada durante anestesia geral para cesáreas, pois pode reduzir o fluxo sanguíneo uterino.
- D) o bloqueio do neuroeixo está contraindicado para a analgesia de parto de pacientes portadoras de eclampsia.

Questão 29

Considerando-se a anestesia em Pediatria, é **CORRETO** afirmar que

- A) a concentração alveolar mínima do anestésico necessário, nesse caso, aumenta com o avançar da idade da criança.
- B) a máscara laríngea não pode ser utilizada no neonato devido à dificuldade de adaptação, pelo tamanho.
- C) a sedação pré-anestésica é contra-indicada no paciente pediátrico devido ao risco de hipoxemia.
- D) o uso de solução de glicose a 5% deve ser evitado em grandes cirurgias, devido ao risco de hiponatremia.

Questão 30

Considerando-se as peculiaridades da anestesia em Geriatria, é **CORRETO** afirmar que

- A) a concentração alveolar mínima dos anestésicos inalatórios mais modernos não apresenta redução nos idosos, em contrapartida aos anestésicos antigos.
- B) a rigidez torácica induzida por opiáceos ocorre com maior frequência no idoso que nos adultos jovens.
- C) as doses efetivas médias (ED95) de agentes bloqueadores neuromusculares se apresentam reduzidas nos idosos, devido à redução da massa muscular.
- D) o uso da anestesia regional é preferível em relação à anestesia geral, devido à menor morbimortalidade associada nos idosos.

Questão 31

É **INCORRETO** afirmar que, entre os medicamentos eficazes na redução da pressão intra-ocular durante anestesia para cirurgia oftalmológica, se inclui

- A) a hiperventilação.
- B) a succinilcolina.
- C) o anestésico inalatório.
- D) o pancurônio.

Questão 32

Analise estas afirmativas concernentes à anestesia para cirurgias ortopédicas:

- I. As técnicas de anestesia regional reduzem a perda sangüínea em pacientes submetidos à cirurgia do quadril.
- II. As cirurgias do joelho, com uso de torniquete, podem ser realizadas sob o bloqueio de dois nervos, a saber, o femural e o ciático.
- III. As cirurgias dos pés e tornozelos podem ser realizadas sob bloqueio dos nervos obturatório (via nervo safeno) e femoral (via nervos tibial posterior, fibular superficial e profundo) — o chamado pentabloqueio.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 33

Analise estas afirmativas concernentes à anestesia em pacientes traumatizados e queimados:

- I. A sedação pré-anestésica deve ser realizada em pacientes que se apresentam confusos ou agitados, após um trauma cranioencefálico, para facilitar o atendimento.
- II. O risco de hipotermia intra-operatória no paciente vítima de trauma é maior que o mesmo risco em pacientes submetidos a cirurgias eletivas.
- III. Os pacientes vítimas de queimaduras em área superior a 30% de superfície corporal total desenvolvem resistência a todos os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, após cerca de uma semana.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 34

Analise estas afirmativas concernentes à anestesia ambulatorial:

- I. A duração do procedimento cirúrgico é um critério para a realização dos procedimentos no nível ambulatorial, pois se relaciona com o tempo de recuperação anestésica.
- II. A necessidade de transfusão durante o procedimento cirúrgico não é uma contra-indicação para os procedimentos ambulatoriais.
- III. Pacientes em extremos de idade não podem ser submetidos a anestesia ambulatorial, devido ao risco de apnéia, nas crianças pré-termo, e ao lento metabolismo de drogas, nos idosos.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I está correta.
- B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 35

Considerando-se os efeitos adversos da dor aguda pós-operatória, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a resposta ao estresse induzida pela dor leva à inibição da função imune, humoral e celular, que resulta em linfopenia, leucocitose e depressão do sistema reticuloendotelial.
- B) as alterações hematológicas induzidas pelo estresse levam à redução da função plaquetária e ao aumento da fibrinólise, que resulta em um estado de hipocoagulabilidade.
- C) as alterações pulmonares induzem alterações na relação ventilação/perfusão, levando à hipoventilação e à hipoxemia.
- D) a liberação de catecolaminas simpatoadrenais e de angiotensina II, que ocorre nesses momentos de dor, resulta em hipertensão, taquicardia e risco de arritmias e isquemia miocárdica.

Questão 36

Considerando-se a ressuscitação cardiopulmonar, é **CORRETO** afirmar que

- A) o uso de bicarbonato de sódio, no tratamento da acidose secundária à parada cardiopulmonar, melhora os resultados obtidos com a desfibrilação elétrica.
- B) a realização de ventilação e compressões torácicas é desnecessária, se a desfibrilação elétrica é possível em até um minuto após o início da fibrilação ventricular.
- C) o uso de doses altas de adrenalina (5-18 mg) apresenta melhora na sobrevivência, no momento da alta hospitalar, em relação às doses habituais (1-2 mg).
- D) um acesso venoso deve ser providenciado, imediatamente após o diagnóstico de parada cardiopulmonar, para possibilitar a administração de medicamentos;

Questão 37

São importantes os cuidados a serem tomados com pacientes usuários de marca-passo quando submetidos a procedimentos cirúrgicos em que se utiliza bisturi elétrico.

Assim sendo, é **CORRETO** afirmar que, nesse caso, é preciso

- A) colocar o gerador do marca-passo no caminho da corrente elétrica do bisturi — placa e ponta.
- B) desativar o sistema de demanda do marca-passo, se ocorrerem sérias interferências.
- C) usar, preferencialmente, o bisturi elétrico monopolar.
- D) utilizar o bisturi elétrico com potências altas.

Questão 38

É **INCORRETO** afirmar que, entre as causas do aumento da saturação venosa mista de oxigênio, se inclui

- A) a diminuição do débito cardíaco.
- B) a insuficiência mitral grave.
- C) o aumento da oferta de oxigênio para os tecidos.
- D) o *shunt* intracardíaco da esquerda para a direita.

Questão 39

Considerando-se a intubação traqueal, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a cartilagem cricóide é o ponto de maior estreitamento das vias aéreas em crianças com menor de 10 anos.
- B) a presença de murmúrio vesicular em ambos os hemitórax garante a intubação da traquéia.
- C) essa intubação por traqueofibrosopia deve ser, preferencialmente, por via nasal.
- D) o óxido nitroso aumenta o volume e a pressão do balonete do tubo endotraqueal, ao equilibrar-se após difusão.

Questão 40

Considerando-se os agentes opiáceos utilizados em anestesia, é **CORRETO** afirmar que

- A) a meia-vida de eliminação da metadona é mais curta que a da morfina.
- B) o *clearance* do fentanil ocorre, principalmente, por excreção inalterada na urina.
- C) o efeito depressor ventilatório da meperidina é menor que o da morfina.
- D) o efeito depressor ventilatório da morfina é similar em idosos e jovens.

Questão 41

Considerando-se a interação medicamentosa com outros agentes anestésicos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a lidocaína e a procaína potencializam o efeito dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes e adespolarizantes.
- B) o uso combinado de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes similares não apresenta efeitos aditivos.
- C) o uso de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes previamente à succinilcolina reduz a potência do bloqueador despolarizante.
- D) os anestésicos inalatórios potencializam o efeito dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes.

Questão 42

Considerando-se a toxicidade dos anestésicos locais, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a adição de epinefrina à lidocaína aumenta o limiar convulsivo desse anestésico administrado por via intravenosa.
- B) a maior velocidade de injeção intravenosa desses anestésicos reduz a aparição de sinais de depressão do sistema nervoso central.
- C) as reações alérgicas do tipo I, mediadas por IgE, são mais comuns com os anestésicos do tipo éster.
- D) os anestésicos locais podem induzir dano concentração-dependente às fibras nervosas de nervos periféricos.

Questão 43

É **INCORRETO** afirmar que, entre as situações que levam à redução na tolerância à anemia e indicam transfusões de concentrado de hemácias com níveis mais elevados de hemoglobina, se inclui

- A) a alcalose.
- B) a gestação.
- C) o bloqueio betaadrenérgico.
- D) os níveis elevados de 2,3-DPG.

Questão 44

Considerando-se a anestesia para cirurgia cardíaca em pacientes portadores de valvulopatias, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a depressão miocárdica é desejável em pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica.
- B) a hipóxia, a hipercarbia e a acidose devem ser evitadas em pacientes portadores de estenose mitral.
- C) a vasodilatação e a taquicardia devem ser evitadas em pacientes portadores de insuficiência aórtica.
- D) a vasodilatação e a taquicardia são ideais em pacientes portadores de regurgitação mitral.

Questão 45

A analgesia pós-operatória em crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos representa um ponto freqüentemente subvalorizado na conduta anestésica.

É **INCORRETO** afirmar que, entre os seguintes métodos, o **mais** indicado para a avaliação da dor pós-operatória em lactentes é

- A) a escala visual análoga.
- B) o auto-relato.
- C) o fisiológico-comportamental.
- D) o questionário de dor de McGill.

(RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.