



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

**PROVAS ESCRITAS DE
GASTROENTEROLOGIA**

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 08

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
5 que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
10 saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
15 uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
25 estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelas laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ **Conhecimentos Especializados**

Questão 16

O Primeiro Consenso Brasileiro Sobre Doença do Refluxo Gastroesofágico(2002) recomenda que seja empregada a esôfagomanometria para posicionamento adequado do catéter de pHmetria prolongada.

A pHmetria prolongada está indicada nas seguintes situações (assinale a alternativa **CORRETA**):

- A) Pacientes com sintomas típicos de doença do refluxo, sem resposta satisfatória ao tratamento com os inibidores de bomba protônica e nos quais o exame endoscópico não revelou dano à mucosa esofágica.
- B) Pacientes com manifestações atípicas extra-esofágicas sem esofagite. Nesses casos, é recomendada a realização do exame com dois ou mais sensores de pH.
- C) Pré-operatório nos casos bem caracterizados, em que o exame endoscópico não revelou esofagite.
- D) Todos os itens estão corretos.

Questão 17

Paciente com 48 anos de idade, obeso, com história de alcoolismo moderado, queixa-se há 12 meses de pirose, regurgitação, eructações e disfagia, inicialmente discreta e, a seguir, com piora do quadro. Recentemente, apresentou dor torácica considerada como de natureza não-coronariana pelo cardiologista. Foi-lhe recomendado realizar a esôfago-gastroduode-noscopia diagnóstica.

Dentre as possibilidades diagnósticas estão as seguintes (assinalar a alternativa **CORRETA**):

- A) Carcinoma do esôfago.
- B) Megaesôfago.
- C) Doença do refluxo gastro-esofágico.
- D) Divertículo de Zencker.

Questão 18

Na Síndrome de Mallory-Weiss, responsável por 5 a 15% dos sangramentos digestivos altos, entidade que adquiriu importância após a sistematização da endoscopia digestiva precoce nos pacientes com HDA, admite-se nessa entidade, que as lacerações do esôfago resultam de grandes gradientes transitórios entre as pressões intragástrica e intratorácica, na junção esôfago-gástrica.

Assinale o mecanismo fisiopatológico causal principal:

- A) Crises convulsivas de repetição.
- B) Exercícios físicos extenuantes.
- C) Vômitos repetidos e ingestão excessiva de álcool.
- D) Manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Questão 19

Em relação à associação entre a gastrite crônica por *Helicobacter pylori* e a dispepsia funcional (ou não-ulcerosa), qual das alternativas é **FALSA**:

- A) *Helicobacter pylori* é o principal agente causal da gastrite crônica.
- B) 30 a 70% dos portadores de dispepsia funcional estão infectados pelo *Helicobacter pylori*.
- C) Não existem evidências convincentes que a erradicação do *Helicobacter pylori* melhore a sintomatologia dos pacientes dispépticos.
- D) Há uma relação direta entre a densidade da infecção pelo *Helicobacter pylori* e a presença de sintomas.

Questão 20

Em relação à terapêutica anti-*H. pylori* na úlcera péptica, assinale a opção **INCORRETA**:

- A) A erradicação do *H. pylori* reduz a taxa de recidivas ulcerosas.
- B) A terapêutica anti-*H. pylori* está indicada em todos os portadores de úlcera péptica infectados pelo microrganismo.
- C) Após um tratamento antimicrobiano bem sucedido, as recidivas ou reinfecções pelo *H. pylori* ocorrem antes das recidivas das úlceras.
- D) Após a erradicação do *H. pylori* as recidivas ulcerosas ocorrem com maior frequência nos fumantes.

Questão 21

O diagnóstico do câncer gástrico baseia-se nos aspectos endoscópicos e no exame histológico das biópsias realizadas durante a endoscopia. Por outro lado, a Endossonografia, ou a Ecoendoscopia, é primordial para o correto estadiamento da lesão tumoral.

Seu valor e acurácia permite afirmar (assinale a alternativa **INCORRETA**):

- A) É importante na definição do câncer gástrico precoce.
- B) A acurácia da endossonografia na avaliação da profundidade da invasão tumoral do carcinoma do estômago, varia de 65% a 86%.
- C) A acurácia do estadiamento regional do câncer gástrico pela Endossonografia é superior à do carcinoma espino celular do esôfago.
- D) A acurácia da endossonografia no diagnóstico do linfoma gástrico atinge a 97%, com uma correta avaliação da profundidade em 92% e do comprometimento dos linfonodos em 85% dos casos.

Questão 22

O teste do hidrogênio respiratório é atualmente considerado como o método indireto mais acurado para o diagnóstico da absorção de açúcares.

Assinale abaixo a alternativa **CORRETA**:

- A) É teste importante para determinar a absorção de lactose, com grande sensibilidade.
- B) Outra aplicação do teste é na detecção da proliferação bacteriana no intestino delgado, especialmente quando se usa substratos de glicose, lactulose ou xilose.
- C) O teste também é usado no estudo da absorção de amido, que pode subsidiar o diagnóstico da insuficiência pancreática.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 23

A biópsia jejunal peroral por cápsula é considerada o padrão ouro para diagnóstico das doenças do intestino delgado. A biópsia está indicada nas principais situações assinaladas abaixo.

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nos pacientes com diarreia crônica, sugestivos de doença do intestino delgado, com má absorção intestinal.
- B) Em pacientes com doença celíaca que não respondem ao tratamento clínico.
- C) Nos pacientes imunodeficientes, principalmente na SIDA ou com hipogamaglobulinemia, com diarreia, com exames parasitológicos, de fezes e coprocultura negativos.
- D) Na intolerância primária à lactose (hipolactasia primária).

Questão 24

As principais indicações da manometria anorretal estão abaixo relacionadas.

Assinalar a alternativa **CORRETA**.

- A) Na incontinência anal.
- B) Na constipação intestinal crônica
- C) Na avaliação pré-operatória de anastomose colorretal baixa.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 25

Constituem-se em contra-indicações absolutas à colonoscopia as seguintes patologias, **EXCETO**

- A) Perfuração intestinal e peritonite generalizada.
- B) Obstrução intestinal
- C) Megacólon tóxico
- D) Gravidez

Questão 26

A litíase intra-hepática é definida como a presença de cálculos biliares acima da junção dos ductos hepáticos direito e esquerdo.

As afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**

- A) Os cálculos têm origem, na maioria das vezes, na vesícula biliar. Atingem a via biliar principal e se deslocam, em sentido ascendente.
- B) Os cálculos intra-hepáticos podem ter origem na própria via biliar, sendo quase sempre decorrentes de estase gerada por estenoses.
- C) A hepatolitíase é fator de risco para o colangiocarcinoma.
- D) O tratamento deve ser sempre individualizado, porém, é em geral, clínico.

Questão 27

Paciente icterico, com acolia fecal, revela ao exame físico volumosa massa no hipocôndrio direito, de natureza elástica, móvel e indolor, compondo a tríade de Courvoisier-Terrier.

Assinale nas alternativas abaixo relacionadas, o mecanismo fisiopatológico fundamental:

- A) Lesão do hepático, acometendo os ramos direito e esquerdo.
- B) Obstrução do cístico e válvulas de Reissessen.
- C) Lesão do colédoco terminal, desde a implantação do cístico à papila, na 2ª porção do duodeno.
- D) Afecção neoplástica primária da vesícula com metástases para a porção central do fígado.

Questão 28

Com referência a hepatite por vírus B, as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**

- A) O antígeno de superfície do vírus B (HbsAg) é detectável tanto na infecção aguda como crônica, indicando sempre infecção em curso.
- B) O antígeno e do vírus B (HbeAg) é geralmente detectável 1 semana depois do surgimento do HbsAg. Sua persistência, decorridas 8 a 10 semanas, sugere fortemente a possibilidade de evolução para a forma crônica.
- C) A presença do anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus B (anti-HBs), indica recuperação da infecção e imunidade.
- D) O anticorpo contra o antígeno e do vírus B (anti-Hbe) é evento de pior prognóstico na evolução da hepatite B.

Questão 29

A doença de Wilson, ou degeneração hépatolenticular, é hereditária e decorre de um distúrbio do metabolismo do cobre, que passa a se acumular anormalmente em diversos órgãos e tecidos, lesando-os. É doença sistêmica, mas suas principais manifestações são de natureza hepática e neurológica.

Assim, os principais parâmetros para o diagnóstico da doença de Wilson, são os abaixo relacionados, **EXCETO**

- A) Hepatopatia ou doença neuropsiquiátrica mal definidas, em crianças ou adultos jovens.
- B) Cobre sérico livre aumentado.
- C) Cobre urinário de 24 horas aumentado.
- D) Ceruloplasmina sérica elevada.

Questão 30

A possibilidade de hemocromatose deverá ser investigada nos pacientes adultos que apresentem, sem uma causa aparente, uma das alterações: hepatomegalia ou hepatopatia crônica, artrite, diabetes, escurecimento anormal da pele, cardiomiopatia, arritmias ou perda da libido. Ao lado dos aspectos genéticos, de importância, os testes laboratoriais que evidenciam sobrecarga de ferro, são os mais utilizados.

As afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**

- A) A determinação do ferro sérico é fundamental para o diagnóstico da doença.
- B) A determinação da saturação da transferrina é o mais sensível teste, pois aumenta no sangue desde a infância.
- C) A ferritina sérica se eleva de forma lenta na hemocromatose, ocorrendo alteração em sua determinação sanguínea depois dos 25-30 anos de idade.
- D) A biópsia hepática está hoje limitada aos casos duvidosos, ou quando já existe suspeita de lesão hepática, em especial a cirrose.

Questão 31

O carcinoma hepatocelular (CHC) é um dos tumores malignos mais comuns na espécie humana, provavelmente o quinto mais comum entre os homens e o nono entre as mulheres.

Os principais fatores de risco do CHC, além do sexo masculino e da idade acima de 40 anos, estão relacionados abaixo, **EXCETO**

- A) Vírus da hepatite B e C.
- B) Aflotoxinas, micotoxinas produzidas por fungos.
- C) O alto teor de ácido prússico contido na raiz da mandioca "brava", de acordo com os hábitos alimentares de povos asiáticos e africanos.
- D) Pacientes com hemocromatose, na fase cirrótica.

Questão 32

A colangite esclerosante primária é doença colestática crônica, de etiologia desconhecida, frequentemente associada á doença inflamatória intestinal, em especial á retocolite ulcerativa crônica.

As seguintes afirmativas estão corretas, **EXCETO**

- A) É doença progressiva, evoluindo para a cirrose hepática, com complicações como a hipertensão portal, insuficiência hepática, ou colangiocarcinoma.
- B) A colangiografia pancreática endoscópica retrógrada (CPER), é o padrão ouro para o diagnóstico dessa entidade.
- C) Devido ao risco potencial da CPER, a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) ganha espaço no diagnóstico da colangite esclerosante primária.
- D) A biópsia hepática por agulha, outrora de grande utilidade no diagnóstico e no estadiamento dessa entidade, hoje está relegada a plano inferior.

Questão 33

A presença de lesões hepáticas avançadas, acompanhadas de esplenomegalia, configura a chamada esquistossomose hépato-esplênica.

As seguintes afirmativas nessa fase da doença estão corretas, **EXCETO**

- A) A fibrose hepática típica assinalada por Symmers, é periportal, respeitando o lóbulo, sem invadi-lo.
- B) Os nódulos de regeneração no fígado, podem subverter a arquitetura hepática normal, com formação de septos fibrosos.
- C) A fibrose periportal acompanha-se, em menor ou maior grau, de obstrução das ramificações portais que, ao lado da perda da elasticidade dos vasos portais, pode levar à hipertensão portal.
- D) O bloqueio hepático fundamental na gênese da hipertensão portal é de natureza pré-sinusoidal.

Questão 34

A quimioterapia na esquistossomose mansoni, mesmo em áreas endêmicas, constitui um eficiente meio de controle, reduzindo as formas mais graves da doença, como a forma hépato-esplênica. Este modelo foi implantado pelo Ministério da Saúde, através do PECE (Programa Especial de Controle da Esquistossomose), à partir de 1975.

O objetivo desse programa em áreas endêmicas, administrando-se a oxamiquine, por exemplo, reduziu de forma acentuada a morbidade da esquistossomose, através do mecanismo abaixo (assinalar a alternativa **CORRETA**):

- A) Conduzindo à cura parasitológica dos indivíduos infectados.
- B) Melhorando o estado geral dos pacientes, com recuperação funcional das alterações hepáticas.
- C) Em face da redução da carga parasitária dos pacientes tratados, houve diminuição da transmissão e conseqüente redução da infecção pelo parasito.
- D) A redução da prevalência e da morbidade da esquistossomose nas áreas endêmicas, tem relação direta com o estado nutricional e imunológico dos pacientes.

Questão 35

Em um paciente com suspeita clínica de litíase biliar, assinale o recurso propedêutico mais indicado para esclarecimento diagnóstico:

- A) Colecistografia oral e/ou venosa.
- B) Radiografia simples de abdome.
- C) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.
- D) Ultra-som abdominal.

Questão 36

Com relação à pancreatite crônica, qual das afirmações abaixo está **CORRETA**:

- A) A esteatorréia só ocorre quando a secreção da lipase pancreática se reduz para menos do que 10% da secreção normal.
- B) A drenagem cirúrgica do pseudocisto é a principal indicação para o tratamento cirúrgico desta afecção.
- C) A radiografia simples de abdome é o exame complementar de maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico da pancreatite crônica de etiologia alcoólica.
- D) Os níveis séricos de amilase e lipase, na pancreatite crônica, se mantêm persistentemente elevados.

Questão 37

Entre as causas de pancreatite aguda enumeradas abaixo, qual delas é a mais comum?

- A) Álcool.
- B) Hiperlipidemia.
- C) Hiperparatireoidismo.
- D) Litíase biliar.

Questão 38

Na síndrome de má absorção intestinal as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A) As doenças que fazem parte do grupo classificado como defeito pré-entérico da absorção intestinal, na verdade traduzem mais um distúrbio digestivo do que absorptivo.
- B) A presença de fezes frescas com pH abaixo de 5,5 sugere má absorção de carboidratos.
- C) A linfangectasia primária é considerada um defeito epitelial da absorção intestinal e caracteriza-se por má absorção de gorduras e por enteropatia perdedora de proteínas.
- D) O teste da D-xilose tem sido usado para estudar a capacidade absorptiva principalmente do intestino delgado proximal.

Questão 39

Na diarreia crônica em consequência de afecção do intestino delgado, como na síndrome de má absorção, os sintomas e sinais abaixo relacionados estão corretos, **EXCETO**

- A) As dejeções são volumosas, amolecidas, líquidas ou semi-líquidas, com grande frequência.
- B) As fezes são geralmente claras, brilhantes, leves, espumosas, com odor pútrido.
- C) A presença de muco e sangue nas evacuações é de observação frequente.
- D) Perda de peso, fadiga e fraqueza, são observados juntamente com outras deficiências calóricas.

Questão 40

Com relação à propedêutica realizada para esclarecimento diagnóstico das diarreias crônicas é **CORRETO** afirmar

- A) O hemograma, a velocidade de hemossedimentação, a dosagem da albumina sérica e a proteína C reativa são exames utilizados para a definição etiológica da diarreia.
- B) O teste do hidrogênio expirado é um exame que possui como única indicação a suspeita de hipolactasia.
- C) A colonoscopia tem seu valor diagnóstico limitado às doenças do intestino grosso.
- D) Através do estudo radiológico das alças jejuno-ileais (trânsito intestinal), na maioria das vezes, é possível se avaliar a extensão e localização das doenças que cursam com má absorção intestinal.

Questão 41

Em relação à doença de Crohn as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**

- A) A faixa etária mais acometida é o adulto jovem.
- B) Caracteriza-se histologicamente por inflamação crônica transmural.
- C) Os granulomas epitelióides são encontrados em aproximadamente 80% das biópsias dos diversos segmentos acometidos.
- D) O diagnóstico baseia-se principalmente nos achados clínicos e radiológicos.

Questão 42

Na Retocolite Ulcerativa, as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**

- A) A evolução natural da colangite esclerosante primária independe dos períodos de remissão e exacerbação da doença intestinal.
- B) O aspecto endoscópico é de grande valor no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes.
- C) A diarreia sempre está presente nos período de atividade da doença.
- D) O processo inflamatório localiza-se predominantemente na mucosa intestinal

Questão 43

Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A) A paracentese terapêutica está indicada nos pacientes cirróticos, apenas nos casos com ascite tensa.
- B) A associação da espironolactona à furosemida, tem mostrado melhores resultados no tratamento inicial da ascite de pacientes cirróticos, do que a administração destas drogas isoladamente.
- C) A norfloxacin é eficaz na prevenção de peritonite bacteriana espontânea em pacientes cirróticos.
- D) A dieta hipossódica associada aos diuréticos (espironolactona e furosemida) mostrou-se capaz de manter o volume urinário satisfatório em 90% dos pacientes cirróticos.

Questão 44

Assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) A colonoscopia é o melhor exame para se estabelecer o diagnóstico e avaliar a extensão e a gravidade da diverticulose cólica.
- B) A diverticulite é complicação que ocorre em 10 a 25% dos pacientes com diverticulose cólica.
- C) Os divertículos cólicos caracterizam-se por serem, histologicamente, divertículos verdadeiros.
- D) O sangramento maciço é observado em 15% dos pacientes com diverticulose cólica.

Questão 45

Assinale a afirmativa ***INCORRETA***:

- A) O câncer colorretal é considerado uma conseqüência inevitável na história natural da polipose adenomatosa familiar.
- B) A síndrome de Peutz-Jeghers caracteriza-se por polipose gastrointestinal e pigmentação mucocutânea.
- C) Os principais sintomas do adenocarcinoma localizado no cólon direito são os decorrentes da anemia ferropriva.
- D) O enema opaco com duplo contraste é o procedimento de escolha no diagnóstico da adenocarcinoma colorretal.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.