



COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
ONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

PROVAS ESCRITAS DE
GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA

VERSÃO “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 09

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO: _____

INSCRIÇÃO N.º _____

LEIA COM ATENÇÃO!

- 1) Este caderno contém **duas provas escritas**: a de **Língua Portuguesa** (questões de **01 a 15**) e a de **Conhecimentos Especializados** (questões de **16 a 45**).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a **troca** deste caderno.
- 2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
 - Use apenas caneta de tinta **azul** ou **preta**.
 - Confira a **VERSÃO** das provas deste caderno — **A, B** ou **C** — e preencha devidamente o campo **VERSÃO**.
 - Preencha, também, o campo **ESP**, relativo ao código da Especialidade.
 - **Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.**
- 3) O período de realização das provas é de **TRÊS HORAS**, acrescidas de mais **QUINZE MINUTOS** para o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas após transcorridas, **no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS**, ou seja, **meta-de do tempo previsto** para a resolução delas.

➤ Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de **01** a **15** relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS

Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse riso.

5 Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.

10 Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que, arrastando malas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros, as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

15 Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo 20 pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

25 Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam, fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.

30 Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família, que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um 35 chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.

As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

40 O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.

Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser jogado no lixo.

45 O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é **CORRETO** afirmar que o título — **A morte sorrindo com dentes pequenos** — se refere a

- A) um camundongo.
- B) um homem.
- C) uma família.
- D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É **CORRETO** afirmar que essa frase, no texto, se configura como

- A) um comentário.
- B) um provérbio.
- C) uma hipótese.
- D) uma sugestão.

Questão 03

“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É **CORRETO** afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, *principalmente*,

- A) adesão.
- B) crítica.
- C) respeito.
- D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É **CORRETO** afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

- A) desafiante.
- B) descortês.
- C) irônica.
- D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é **CORRETO** afirmar que essa frase se relaciona

- A) à gritaria.
- B) à multidão.
- C) às paredes.
- D) às risadas.

Questão 06

“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É **CORRETO** afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é consequência da ação de

- A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
- B) considerar uma multidão nervosa.
- C) eliminar um pequeno animal.
- D) exhibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É **CORRETO** afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico em

- A) duas palavras.
- B) três palavras.
- C) quatro palavras.
- D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
- C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
- D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

- A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
- B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
- C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
- D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu *súbita*.” (linha 37)

É **CORRETO** afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

- A) adjunto adnominal.
- B) adjunto adverbial.
- C) complemento nominal.
- D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.

- A) As pessoas hesitaram *um instante*, olhando o homem... (linha 38)
- B) Eu havia acabado de chegar *com três companheiros de trabalho*. (linha 14)
- C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido *pelos laterais*... (linha 22)
- D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando *nas de trás*. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um sujeito posposto ao verbo.

- A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
- B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
- C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
- D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há um pronome com função de substantivo.

- A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
- B) Não havia nada à frente... (linha 29)
- C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
- D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, **NÃO** há uma conjunção subordinativa.

- A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
- B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
- C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
- D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está **CORRETAMENTE** identificada entre colchetes.

- A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
- B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
- C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
- D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

➤ **Conhecimentos Especializados**

Questão 16

É **CORRETO** afirmar que, na avaliação endometrial, a presença de reação decidual e, simultaneamente, a ausência de vilosidades coriais esta relacionada a

- A) amenorréia.
- B) elevação de gonadotrofina coriônica.
- C) gravidez ectópica.
- D) mola hidatiforme.

Questão 17

Paciente apresenta quadro clínico de metrorragia precoce, fluxo reduzido, de longa duração, dores fugazes e intermitentes regulares e pouco intensas. Está sem febre e o volume uterino é proporcional à idade da gestação.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o diagnóstico clínico correspondente ao caso é o de

- A) abortamento completo.
- B) abortamento incompleto infectado.
- C) ameaça de abortamento.
- D) retenção de ovo anembrionado.

Questão 18

Durante a evolução da gravidez, têm sido referidas alterações que denunciam, precocemente, o surgimento da doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) e de outras alterações de ordem clínica e laboratorial.

Assim sendo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o aumento de 1.000 g por semana e 3.000 g por mês é sinal denunciador de DHEG.
- B) o teste da noradrenalina, após a 13^a semana, em gestantes que desenvolveram DHEG, apresentam níveis tensionais normais.
- C) o teste de decúbito-supino, aplicado entre a 28^a e a 32^a semanas de gestação, consiste na determinação da pressão arterial em decúbito lateral esquerdo e em decúbito horizontal.
- D) os níveis de pressão arterial, que, medidos durante a prenhez, declinam até o 2^o trimestre, quando, então, se elevam, constituem fenômeno que não se observa na DHEG.

Questão 19

Considerando-se as ocorrências de sífilis, é **CORRETO** afirmar que

- A) a influência dessa doença sobre a gravidez e o feto, após o 5^o mês, pode resultar em abortamento, crescimento retardado, natimorto e feto com sífilis congênita.
- B) a possibilidade de transmissão dessa doença é menor na primeira gestação e sempre aumenta na segunda ou terceira.
- C) essa doença pode ser transmitida ao feto pela mãe e pelo pai no momento da fecundação.
- D) todo filho de mãe sífilítica — ou seja, 100% deles — padecerá de sífilis congênita.

Questão 20

No assoalho pélvico, cada sistema orgânico atravessa a pelve e sai através de seu próprio orifício. Assim sendo, esses sistemas estão intrinsecamente relacionados à função e ao suporte anatômico.

Considerando-se esses sistemas, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a pelve circunda e protege seu conteúdo, mas, na realidade, por si só, lhe proporciona pouca sustentação.
- B) o músculo pubococcígeo ou puboviceral, ao contrair-se, traciona o reto, a vagina e a uretra, anteriormente, em direção ao osso do púbis e contrai a luz desses órgãos.
- C) os ligamentos pélvicos são os fatores mais importantes na sustentação pélvica e são muito adequados para manter a sustentação ao longo do tempo, porque esses tecidos fibrosos não se alongam.
- D) os órgãos pélvicos são sustentados, basicamente, pela atividade muscular do assoalho pélvico, no que é auxiliado pelas fixações ligamentares.

Questão 21

Vários termos são usados para descrever o prolapso genital feminino, embora esses termos sejam insatisfatórios e imprecisos.

Assim sendo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a cistocele consiste no deslocamento inferior da bexiga.
- B) a cistouretrocele consiste numa cistocele que inclui a uretra como parte do complexo de órgãos prolapsados.
- C) a enterocele e a retocele consistem em protusões do reto para a luz vaginal posterior.
- D) o prolapso uterino consiste na descida do útero e do colo pelo canal vaginal em direção ao intróito vaginal.

Questão 22

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são altamente prevalentes em todo o mundo e têm quadro clínico importante.

Considerando-se o quadro clínico de algumas DST, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a *Neisseria gonorrhoeae* é um diplococo Gram-negativo intracelular que causa, geralmente, no homem, uretrite anterior aguda e, na mulher, endocervicite.
- B) o cancro mole é uma doença, causada pelo *Haemophilus Ducreyi*, que apresenta ulcerações extremamente dolorosas, acompanhadas por linfadenomegalia inguinal também dolorosa.
- C) o herpes simples, causado pelo *Herpesvirus hominis* (HSV), apresenta vesículas agrupadas misturadas a pequenas úlceras e o tratamento supressor implica a total eliminação viral sintomática ou assintomática.
- D) o linfogranuloma venéreo, causado pela *Chlamidia trachomatis*, apresenta bubão inguinal e lesão ulcerosa de inoculação múltipla e dolorosa.

Questão 23

A menopausa é a fase de vida da mulher que marca a transição entre o período reprodutivo e o não-reprodutivo e se caracteriza por um grau variado de alterações somáticas.

Considerando-se essas alterações, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a diminuição do estrogênio pode ser responsável pela aceleração de alterações cutâneas, relacionadas à capacidade do estrogênio de evitar e restaurar a perda de colágeno cutâneo.
- B) a hipoestrogenemia tem efeito direto sobre a função osteoblástica, porque o estrogênio age diretamente nos ossos, e parece exercer seus efeitos adversos por alteração do equilíbrio do cálcio.
- C) a produção total de androgênio, após a menopausa, aumenta, principalmente, devido à produção ovariana e à produção da supra-renal.
- D) a queda do estrogênio afeta o trofismo da mucosa uretral, promovendo seu encurtamento, diminuindo sua espessura e alterando sua angulação e estática, o que pode resultar em incontinência urinária.

Questão 24

Considerando-se o estadiamento do Ca de colo uterino pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), é **INCORRETO** afirmar que,

- A) no Estádio **0** (zero), o carcinoma *in situ*, é intra-epitelial.
- B) no Estádio **I**, o carcinoma permanece rigorosamente limitado ao colo.
- C) no Estádio **II**, o carcinoma se estende além do colo, até atingir a parede pélvica.
- D) no Estádio **III**, o carcinoma se estende para além da pelve verdadeira, promovendo hidroureter ou rim não-funcionante.

Questão 25

É **INCORRETO** afirmar que, entre as complicações agudas da histerectomia radical, se inclui a

- A) disfunção vesical pós-operatória.
- B) embolia pulmonar.
- C) fístula ureterovaginal.
- D) obstrução do intestino delgado.

Questão 26

Considerando-se os tumores ovarianos, **INCORRETO** afirmar que

- A) o carcinoma de células claras do ovário é histologicamente idêntico àquele observado no útero ou na vagina de paciente jovem em uso dietilestilbestrol.
- B) o pseudomixoma peritoneal é comumente secundário ao carcinoma mucinoso ovariano, a mucocele do apêndice ou ao carcinoma bem diferenciado do apêndice.
- C) o tumor endometrióide de baixo potencial de malignidade possui amplo espectro morfológico e pode assemelhar-se aos pólipos endometriais ou a hiperplasia endometrial complexa, com aglomerado de glândulas.
- D) os tumores de Brenner proliferativos invadem o estroma e podem se assemelhar ao carcinoma papilar de células transicionais de baixo grau da bexiga.

Questão 27

Na dor pélvica, é difícil distinguir as causas ginecológicas e gastrointestinais de sinais e sintomas de outras condições.

Assim sendo, é **INCORRETO** afirmar que, entre os sintomas característicos da síndrome do cólon irritável, se inclui

- A) a flatulência excessiva, a diarreia e a constipação alternada.
- B) o aumento da dor após a defecação.
- C) o aumento da dor durante a menstruação.
- D) o cólon sigmóide doloroso e palpável.

Questão 28

Na videolaparoscopia, na obtenção do pneumoperitônio em paciente com história de duas laparotomias anteriores para dor pélvica, o local **CORRETO** para a colocação da agulha de Verres é o

- A) ponto de McBurney.
- B) quadrante superior direito.
- C) quadrante superior esquerdo.
- D) suprapúbico.

Questão 29

É **INCORRETO** afirmar que, entre os métodos utilizados para a ligadura do infundíbulo pélvico na ooforectomia, por via laparoscópica, se inclui

- A) a ligadura por sutura com nó extracorporal.
- B) a técnica bipolar, que utiliza corrente de corte.
- C) a técnica monopolar, que utiliza corrente de coagulação.
- D) o dispositivo de grampeamento endoscópico.

Questão 30

Uma paciente em uso de DIU Progestsert, há três anos sem problema, informa que seu último período menstrual está com um atraso de sete semanas. Constata-se, então, gravidez, que a paciente deseja que continue.

Nesse caso, é **CORRETO** afirmar que a conduta *mais* indicada consiste em

- A) assegurar à paciente que é improvável haver problemas com o DIU, porque este está no lugar há três anos sem causar transtornos.
- B) discutir alternativas com a paciente, se os cordões estiverem visíveis, mas sugerir a retirada do DIU imediatamente.
- C) recomendar consultas freqüentes e informação de qualquer dor, sangramento ou febre, bem como permitir que a gravidez continue, mantendo-se o DIU no lugar.
- D) recomendar firmemente a interrupção da gravidez devido ao risco de alto grau de infecção.

Questão 31

Uma paciente, na 34^a semana de gestação, apresenta-se com hipertensão, edema e proteinúria.

Considerando-se o quadro clínico descrito, é **CORRETO** afirmar que esses sinais sugerem, *obrigatoriamente*,

- A) doença hipertensiva específica da gravidez.
- B) glomerulonefrite membranosa.
- C) hipertensão associada à gestação.
- D) nefropatia associada a gestação.

Questão 32

Numa gestante, a reatividade vascular à angiotensina II e ao sistema renina/angiotensina/aldosterona está acentuadamente perturbada, o que explica a redução na sua resistência vascular. Sabe-se que a reatividade vascular, na gravidez humana, é equilibrada.

Assim sendo, é **INCORRETO** afirmar que, entre os fatores que contribuem, pelo menos em parte, para esse equilíbrio, se inclui(em)

- A) a ação das prostaglandinas sobre a camada muscular lisa dos vasos.
- B) a atuação da progesterona, que pode modificar os efeitos das prostaglandinas.
- C) a manutenção, no sistema, de nucleotídeos cíclicos da musculatura dos vasos.
- D) os distúrbios na concentração de cálcio intracelular.

Questão 33

Considerando-se a identificação e avaliação de alterações fisiológicas nos sistemas fibrinolíticos e de coagulação durante a gravidez e o purpério, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as concentrações de fibrinogênio são sempre mais elevadas em relação aos parâmetros preestabelecidos.
- B) os fatores fibrinolíticos e a atividade de plasminogênio aumentam.
- C) os fatores pré-coagulantes se elevam com a idade gestacional.
- D) os teores de proteína S se elevam, progressivamente, a partir da décima semana de gravidez.

Questão 34

Considerando-se a anatomia e a fisiologia do puerpério, em que prevalecem os fenômenos catabólicos e involutivos das estruturas hipertrofiadas e hiperplasiadas na gravidez, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a cérvix, a três dias do parto, está anatomicamente reconstituída, embora permaneça permeável, o que torna possível se distinguirem os limites do canal cervical.
- B) a crise vaginal é objetivada pela descamação do epitélio reduzido às camadas profundas, já que, a partir do 15º dia de pós-parto, é difícil se distinguirem, no epitélio vaginal, os casos com lactação dos sem lactação.
- C) as modificações no útero são: a fase de retenção dos elementos deciduais, ou regressiva; a fase regenerativa por cicatrização do endométrio; a fase regenerativa por proliferação hormonal; e fase restabelecimento do ciclo menstrual.
- D) o período de duração é impreciso no pós-parto remoto, quando, também, o útero involui, o endométrio prolifera nos moldes habituais e o esfregaço vaginal readquire padrão normoestrogênico.

Questão 35

O diagnóstico de apresentação e posição apenas não está completo, sendo necessário acrescentar-lhe a variedade de posição, que se define como a relação dos pontos de referência fetais com os pélvicos.

É **INCORRETO** afirmar que, entre esses pontos de referência, se inclui

- A) a córmica, nas apresentações transversas.
- B) a crista sacrococcígea, nas apresentações pélvicas.
- C) a glabella ou raiz, no nariz (fronte).
- D) a lambda, nas apresentações cefálicas defletidas.

Questão 36

A amniocentese é imprescindível, ainda, nos trabalhos de investigação do sistema amniótico e complementa as hemotransfusões intra-uterinas do concepto.

Considerando-se a amniocentese, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as pesquisas microbiológicas permitem conhecer-se eventual contaminação do líquido amniótico, tendo-se em vista o diagnóstico de aminionite, corionite, placentite, funiculite e infecções fetais.
- B) o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento e a prevenção da doença hemolítica, ao fornecerem à clínica os elementos necessários para a vigilância das condições do feto com apenas uma punção, têm marcado a oportunidade das medidas terapêuticas.
- C) o estudo do líquido amniótico serve para análises bioquímicas, espectrofométricas, imunológicas e hormonais.
- D) o líquido amniótico subsidia, ainda, o diagnóstico de maturidade fetal, o estudo das células esfoliativas do feto, a análise da concentração de creatinina, a espectrofotometria para bilirrubina e surfactantes fosfolípidos.

Questão 37

Durante o ciclo grávido-puerperal, existem fatores considerados de risco para transmissão do HIV.

Considerando-se esses fatores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) os fatores genéticos fetais relacionados com a resposta imune indicam as variações no HLA, que podem implicar maior, ou menor, suscetibilidade a várias doenças infecciosas, inclusive à infecção pelo HIV.
- B) os fatores intraparto mostram uma correlação entre a presença e maior quantidade de partículas virais e as células infectadas pelo HIV no trato genital, com um maior risco de transmissão desse vírus.
- C) os fatores maternos incluem as relações sexuais sem preservativos, múltiplas parcerias sexuais na gestação e uso de drogas ilícitas.
- D) os receptores betaquimiocinas atuam ao lado do CD4 como receptores para ligação e infecção do HIV em células-alvo; já os macrófagos placentários expressam receptores alfaquimiocinas, mas sua expressão encontra-se diminuída nos estados de ativação imunológica.

Questão 38

A doença hemolítica perinatal, ou eritroblastose fetal e do recém-nascido, é uma afecção generalizada, que é acompanhada de anemia, destruição das hemácias e presença de formas jovens ou imaturas na circulação periférica.

Considerando-se essas informações, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a aloimunização ocorre quando hemácias Rh-positivo são introduzidas no organismo da mãe, onde são totalmente desconhecidas, porque a gestante não possui o antígeno Rh.
- B) a imunoantigenicidade dos anticorpos RH depende do número de sítios antigênicos em suas hemácias, o que lhe define a importância clínica.
- C) a transferência de anticorpos da mãe para o filho só pode ser feita através da placenta e, nesse caso, a única imunoglobulina transferível é a IgM, que se liga ao receptor Fc de membrana plasmática.
- D) o desconhecimento do antígeno D da receptora, antes da aplicação de transfusão de sangue em pessoas Rh negativo, é altamente danoso e condenável, pois as hemácias D positivo formam anticorpos anti-D.

Questão 39

Uma paciente procura a clínica de uroginecologia. Após ser submetida a exames e com base na sua história da moléstia atual, é compatível com o diagnóstico de bexiga hiperativa.

Nesse caso, é **CORRETO** afirmar que o estudo urodinâmico *mais* útil para se confirmar o diagnóstico é o de

- A) avaliação de pressão de fluxo.
- B) gráfico de frequência e volume vesical em 48 horas.
- C) pressão do ponto de extrazamento de valsalva.
- D) ultra-sonografia pélvica.

Questão 40

Considerando-se a avaliação do caráter da dor pélvica e da dismenorréia, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a dor aguda é intensa e se caracteriza por início súbito, aumento abrupto e curta duração.
- B) a dor crônica ainda é um diagnóstico geral, amplo, que compreende muito mais causas específicas, desde a endometriose até a síndrome de compressão nervosa.
- C) a dor referida é superficial e sua localização é dificultada pela determinação da inervação da víscera afetada.
- D) os abscessos tuboovarianos, uma seqüela da salpingite aguda, são, geralmente, bilaterais, mas não é raro haver formação de abscesso unilateral.

Questão 41

Considerando-se a vascularização pélvica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a rede vascular pélvica tem a capacidade de expandir, significativamente, o volume e o fluxo durante a gravidez.
- B) os ramos das artérias ilíacas internas podem, sempre, ser identificados pela ordem de saída do vaso original.
- C) os vasos pélvicos desempenham um papel importante na sustentação da pelve.
- D) uma perfusão pélvica contínua costuma ocorrer após ligadura das duas artérias ilíacas internas (hipogástricas), devido ao extenso suprimento sangüíneo colateral.

Questão 42

O ureter, quando entra na pelve, guarda uma relação de proximidade com os vasos ilíacos.

Assim sendo, é **CORRETO** afirmar que o ureter cruza

- A) a artéria hipogástrica (ilíaca interna), medialmente à bifurcação da artéria uterina.
- B) a artéria hipogástrica (ilíaca interna), no nível da bifurcação da divisão posterior.
- C) os vasos ilíacos comuns em sua bifurcação, lateralmente aos vasos ováricos.
- D) os vasos ilíacos comuns em sua bifurcação, logo medialmente aos vasos ováricos.

Questão 43

Várias anormalidades metabólicas, respiratórias e eletrolíticas podem acontecer no período pós-operatório.

Considerando-se essa informação, é **CORRETO** afirmar que

- A) a acidose metabólica implica diminuição da contratilidade miocárdica; propensão à vasodilatação periférica, que leva à hipotensão; e refratariedade do coração fibrilante à desfibrilação.
- B) a acidose respiratória resulta da retenção de dióxido de carbono em pacientes com hipoventilação por depressão do sistema nervoso central.
- C) a alcalose é um distúrbio acidobásico, comum no período pós-operatório, que tem significado clínico e necessita de medicação para sua resolução.
- D) a perfusão tecidual, em pacientes com acidose láctica, deve ser restabelecida, podendo-se realizar por meio de suporte cardiovascular e pulmonar.

Questão 44

É **CORRETO** afirmar que o *principal* instrumento de tratamento, no pós-operatório, de paciente com suspeita de íleo paralítico consiste na

- A) administração de agentes farmacológicos para estimular a função gastrointestinal.
- B) decompressão gastrointestinal e dos líquidos intravenosos.
- C) instilação de material de contraste radiológico hipertônico para estimular a função peristáltica do intestino.
- D) intervenção cirúrgica para corrigir o bloqueio intestinal.

Questão 45

Uma paciente, com 35 anos, tem diagnóstico de carcinoma ovariano em estágio II e é submetida a pan-histerectomia. No quinto dia de pós-operatório, ela desenvolve trombose venosa profunda femoral.

Considerando-se o quadro clínico descrito, é **CORRETO** afirmar que o tratamento **mais** indicado para a paciente consiste em

- A) estreptoquinase intravenosa por 72 horas, seguida de varfarina oral durante três meses.
- B) heparina intravenosa durante 10 dias, seguida de varfarina oral durante três meses.
- C) heparina intravenosa durante cinco dias, seguida de varfarina oral durante três meses.
- D) repouso no leito, com elevação das pernas, e início imediato de varfarina oral durante três meses.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.