LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto abaixo.

Tecendo a manhã

(**João Cabral de Melo Neto**)

1

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

2

E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

1. A partir da leitura de todo o poema, depreende-se que ele apresenta

(A) a maneira como os galos gritam nas manhãs a fim de fazer com que todos acordem.

(B) um fato sem importância que aconteceu em uma manhã qualquer.

(C) um trabalho individualizado e que não tem um produto final.

(D) a construção solidária de um objeto, de uma obra ou de uma nova sociedade.

2. O provérbio que se aplica ao poema é

(A) de grão em grão a galinha enche o papo.
(B) uma andorinha só não faz verão.
(C) cada um por si e Deus por todos.
(D) quando um não quer dois não brigam.

3. O poema apresenta basicamente as seguintes oposições:

(A) individualidade × coletividade e dependência × autonomia.

(B) trabalho × ócio e solidariedade × individualidade.

(C) produtividade × improdutividade e independência × insegurança.

(D) capacidade de criação × falta de criatividade e atividade × inatividade.

4. Em ***entretendendo*** (entretender), nota-se a presença das palavras

(A) entender; tenda; estender; entreter.

(B) entre; tenda; entender; tender.

(C) entre; entristecer; depender; tender.

(D) entretenimento; entendimento; tendência; distender.

5. Na oração *Um galo sozinho **não** tece uma manhã*:, a palavra em destaque tem a função sintática de

(A) sujeito.

(B) adjunto adnominal de negação.

(C) adjunto adverbial de negação.

(D) objeto direto.

6. No período *Como havia muitas pessoas na sala, fiquei sufocada*, a palavra ***como*** é uma conjunção subordinativa

(A) comparativa.

(B) proporcional.

(C) conformativa.

(D) causal.

Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa que preenche corretamente, pela ordem, as lacunas dos períodos apresentados.

7. A documentação que _____ nesta tarde está completa, acabei de _____ . _____ amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. _____ ao _____ .

(A) me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; Avisem-me; recebê-la.

(B) me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me avisem; recebê-la.

(C) enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; Avisem-me; receber-la.

(D) enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me avisem; recebê-la.

8. Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima semana. A empresa aérea acabou de confirmar que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me atrasar, sairei de casa mais cedo ____ fim de não perder o vôo.

(A) à; a; às; As; à
(B) à; à; às; Às; a
(C) a; a; às; Às; a
(D) a; a; as; Às; à

9. A seqüência em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente é

(A) ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.

10. Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a mesma regra de acentuação em

(A) ítem; também; armazéns; contém.

(B) Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.

(C) calvície; mágoas; errôneos; imundície.

(D) desejá-los; ímã; atrás; saída.

11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em

(A) aleijar; problema; supertição; etmologia.

(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; ponteagudo.

(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.

(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.

12. Todas as palavras são formadas por hibridismo em

(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum.
(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.
(C) monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar.
(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança.

13. O uso de vírgula está INCORRETO em:

(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.

(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o marido saíra de casa.

(C) É interessante, a oferta mas não tenho o dinheiro necessário.

(D) No meio da confusão, a criança.

14. As orações em destaque:

Esperamos ***que o novo chefe cumpra seu dever***.

Como estava chateada**,** não saí *de casa.*

Estão corretamente classificadas, respectivamente, em

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial causal.

(B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.

(C) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração coordenada sindética explicativa.

(D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.

15. Ao relacionar a coluna da direita com a da esquerda, numerando as figuras de linguagem, a seqüência correta é

I. Eles, o seu único desejo é exterminar-nos. (Garret)	1. pleonasmo
II. Maria embarcou em um avião gigantesco.	2. anacoluto
III. Li Machado de Assis ainda no ginásio.	3. metonímia
IV. A mulher não acreditava naquilo que seus próprios olhos viam.	4. catacrese

(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1
(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3
(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2
(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1

ESPECIALIDADE

16. A *Tríade de Virchow* é caracterizada por

(A) antracose, enfisema centro-acinar e enfisema bolhoso.

(B) injúria endotelial, alterações do fluxo sangüíneo e hipercoabilidade do sangue.

(C) trombose venosa profunda, tromboembolia pulmonar e cor *pulmonale* agudo.

(D) hiperemia, congestão e hemorragia intersticial.

17. A apoptose

(A) refere-se a um mecanismo de morte celular programada.

(B) não tem relação com o desenvolvimento fetal.

(C) não é regulada pelos membros da família Bcl-2.

(D) ocorre exclusivamente em neoplasias malignas.

18. A necrose caseosa é caracterizada por

(A) material eosinofílico amorfo granular associado a granulomas com células gigantes epitelióides.

(B) material eosinofílico amorfogranular associado a neutrófilos polimorfonucleares.

(C) grupamentos de células degeneradas e edema associados a granulomas com células gigantes epitelióides.

(D) grupamentos de células degeneradas e edema associados a neutrófilos polimorfonucleares.

19. É encontrada no Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) o tipo de necrose

(A) de liquefação.
(B) caseosa.
(C) fibrinóide.
(D) de coagulação.

20. Em relação aos acúmulos intra ou extra-celulares

(A) os Corpúsculos de *Russell* são depósitos de proteína (imunoglobulina) a partir de plasmócitos.

(B) a calcificação distrófica está associada a estados de hipercalcemia, sendo que o aumento da produção de paratormônio é uma de suas causas.

(C) a hemocromatose é uma doença de depósito, caracterizada pelo acúmulo de íon cobre nos hepatócitos.

(D) a amiloidose sistêmica está associada à Doença de Alzheimer.

21. Os eosinófilos

(A) são células inflamatórias encontradas na reação enxerto × hospedeiro.

(B) modulam reações mediadas por imunoglobinas.

(C) exibem propriedade de fagocitose de microorganismos e restos celulares.

(D) apresentam grânulos citoplasmáticos que contêm leucotrienos.

22. São exemplos anatomoclínicos de inflamação granulomatosa:

(A) Tuberculose, Hanseníase e Meningite Meningocócica.

(B) Tuberculose, Blastomicose Sul-Americana e Sarcoidose.

(C) Histoplasmose, Blastomicose Sul-Americana e Giardíase.

(D) Amebíase, Hanseníase e Conjuntivite por *Chlamydia trachomatis*.

23. São exemplos de neoplasias benignas:

(A) linfoma e leiomioma.

(B) melanoma e lipoma.

(C) osteossarcoma e fibroma.

(D) fibroadenoma da mama e condroma.

24. Anaplasia, elevado índice mitótico, invasão angiolinfática e metástase são características de

(A) processos reparativos e cicatriciais.

(B) neoplasias benignas.

(C) neoplasias malignas.

(D) doenças de depósito.

25. As infecções oportunistas, encontradas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), por fungos, são

(A) toxoplasmose e candidíase.

(B) criptococose e *molluscum contagiosum*.

(C) criptosporidiose e pneumocistose.

(D) histoplasmose e pneumocistose.

26. O termo morfológico *coilocitose* está relacionado a infecções

(A) por vírus herpes simplex.

(B) pelo papilomavírus humano (HPV).

(C) pelo adenovírus.

(D) pelo citomegalovírus.

27. São doenças em tecido linfóide associadas à infecção pelo vírus Epstein-Barr:

(A) doença da arranhadura do gato; mononucleose infecciosa e linfoma MALT.

(B) histiocitose de células de Langerhans; mononucleose infecciosa e linfoma Burkitt.

(C) mononucleose infecciosa; doença de Hodgkin e linfoma Burkitt.

(D) doença de Hodgkin; micose fungóide e mieloma múltiplo.

28. A displasia refere-se a

(A) desordem de crescimento e de maturação celular e tecidual pré-neoplásica.

(B) alteração reversível em que uma célula de tipo adulto é substituída por outra (epitelial ou mesenquimal).

(C) mal-formação de diferentes tecidos em sítio anatômico específico.

(D) proliferação anormal e invasiva de células mesenquimais e epiteliais imaturas.

29. A técnica Histoquímica de Impregnação Argêntica (Prata) é universalmente usada para a pesquisa dos

(A) bacilos álcool-ácido resistentes e fungos.

(B) bacilos álcool-ácido resistentes e *Criptococus* sp.

(C) helicobacter *pylori* e fungos.

(D) helicobacter *pylori* e bacilos álcool-ácido resistentes.

30. No sistema nervoso central,

(A) o hematoma epidural por hemorragia da artéria meníngea média tende a ser uma lesão organizada e auto-limitada.

(B) o astrocitoma pilocítico é uma neoplasia freqüentemente encontrada em índivíduos idosos.

(C) os microaneurismas de Charcot-Bouchard estão associados à hipertensão crônica.

(D) os meduloblastomas são neoplasias localizadas acima da Sela Túrcica e são derivados do epitélio da Bolsa de Rathke.

31. Paciente, sexo masculino, 36 anos de idade, apresenta morte súbita. A necrópsia revelou cardiomegalia global, com dilatação das câmaras cardíacas, epicardite em *rosário* e aneurisma ventricular com múltiplos trombos parietais à esquerda, com desvio septal. A causa mais provável do óbito é

(A) cardiopatia chagásica crônica.

(B) infarto do miocárdio.

(C) cardiopatia hipertensiva.

(D) cardiopatia reumática.

32. Sobre as neoplasias do sistema urinário, é INCORRETO afirmar que

(A) o carcinoma de células renais é também designado de hipernefroma.

(B) o carcinoma de células renais é diagnosticado, muitas vezes, a partir de suas metastases, antes de suas manifestações locais.

(C) os pulmões e o cérebro são sítios metastáticos infreqüentes de neoplasias renais.

(D) o Tumor de Wilms é uma neoplasia maligna renal da infância.

33. São exemplos de doenças dermatológicas de comprometimento da interface dermoepidérmica:

(A) lúpus eritematoso; líquen plano e eritema multiforme.

(B) lúpus eritematoso; líquen plano e eritema nodoso.

(C) esclerodermia; impetigo e psoríase.

(D) esclerodermia; eritema nodoso e psoríase.

34. As propriedades relacionadas à hepatite por vírus C são

(A) vírus RNA (flavovírus); transmissão fecal-oral, com rápida evolução para hepatite crônica com agregados linfóides foliculares em espaços-porta; e transformação para cirrose.

(B) vírus RNA (flavovírus); transmissão por sangue infectado, com rápida evolução para hepatite crônica com agregados linfóides foliculares em espaços-porta; e transformação para cirrose.

(C) vírus DNA (hepadnavírus); transmissão por sangue infectado; hepatite aguda com provável remissão, ou evolução para hepatite crônica, e infreqüente cirrose.

(D) enterovírus; transmissão fecal-oral e infreqüente necrose hepática submaciça.

35. Paciente, sexo masculino, 45 anos de idade, sem antecedentes de tabagismo, apresenta no exame de broncoscopia tumoração polipóide intrabrônquica de 1,8 cm, de coloração róseo-amarelada. A lesão descrita, provavelmente, é

(A) adenocarcinoma.
(B) carcinoma bronquíolo-alveolar.
(C) carcinoma de células escamosas.
(D) tumor carcinóide brônquico.

36. A respeito das afecções intestinais, é INCORRETO afirmar que

(A) a doença de Crohn é uma inflamação segmentar transmural com presença de fissuras e granulomas não caseosos.

(B) a retocolite ulcerativa é uma inflamação mucosa e submucosa e não granulomatosa a partir do reto.

(C) a colite actínica compromente mais freqüentemente o cólon direito e a região íleo-cecal.

(D) o infarto hemorrágico do intestino delgado é a manifestação morfológica encontrada em tromboses mesentéricas.

37. Paciente, sexo feminino, 72 anos de idade, apresenta em face lesão nodular perlácea, com bordos acastanhados de 1,0 cm de diâmetro. O aspecto histológico e o diagnóstico mais provável dessa lesão, respectivamente, são

(A) proliferação de células escamosas e carcinoma espinocelular.

(B) proliferação de células névicas melanocíticas e nevo melanocítico displásico.

(C) proliferação de células basais e queratose seborréica.

(D) proliferação de células basais e carcinoma basocelular.

38. Associa-se à infecção pelo helicobacter *pylori*, EXCETO

(A) gastrite crônica e úlcera péptica.

(B) síndrome de Zollinger-Ellison.

(C) carcinoma gástrico.

(D) linfoma gástrico.

39. A neoplasia de células germinativas mais freqüente em testículo é

(A) seminoma.

(B) teratoma imaturo.

(C) coriocarcinoma.

(D) tumor do seio endodérmico.

40. A respeito de leishmaniose,

(A) a forma mucocutânea compromete preferencialmente a mucosa oral, septo nasal, laringe, ânus e vulva, sendo caracterizada pela presença de raros parasitas em reação granulomatosa.

(B) a forma visceral é caracterizada pela invasão de parasitas no sistema retículo-endotelial, com hepatoesplenomegalia e linfadenopatia secundárias.

(C) a forma cutânea isolada é de resposta imune anérgica e é representada por pápula indurada ou úlcera com significativa quantidade de leishmanias em macrófagos xantomatosos.

(D) as aves domésticas são hospedeiros naturais desse parasita.