

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Instrução:** As questões de 1 a 5 correspondem ao texto abaixo.

### Tecendo a manhã

(João Cabral de Melo Neto)

1

*Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito que um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos.*

2

*E se encorpando em tela, entre todos,  
se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão.*

- A partir da leitura de todo o poema, depreende-se que ele apresenta
  - a maneira como os galos gritam nas manhãs a fim de fazer com que todos acordem.
  - um fato sem importância que aconteceu em uma manhã qualquer.
  - um trabalho individualizado e que não tem um produto final.
  - a construção solidária de um objeto, de uma obra ou de uma nova sociedade.
- O provérbio que se aplica ao poema é
  - de grão em grão a galinha enche o papo.
  - uma andorinha só não faz verão.
  - cada um por si e Deus por todos.
  - quando um não quer dois não brigam.
- O poema apresenta basicamente as seguintes oposições:
  - individualidade **x** coletividade e dependência **x** autonomia.
  - trabalho **x** ócio e solidariedade **x** individualidade.
  - produtividade **x** improdutividade e independência **x** insegurança.
  - capacidade de criação **x** falta de criatividade e atividade **x** inatividade.
- Em **entretendendo** (entretender), nota-se a presença das palavras
  - entender; tenda; estender; entreter.
  - entre; tenda; entender; tender.
  - entre; entristecer; depender; tender.
  - entretenimento; entendimento; tendência; distender.

- Na oração *Um galo sozinho não tece uma manhã*, a palavra em destaque tem a função sintática de
  - sujeito.
  - adjunto adnominal de negação.
  - adjunto adverbial de negação.
  - objeto direto.

- No período *Como havia muitas pessoas na sala, fiquei sufocada*, a palavra **como** é uma conjunção subordinativa
  - comparativa.
  - proporcional.
  - conformativa.
  - causal.

**Instrução:** Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa que preenche corretamente, pela ordem, as lacunas dos períodos apresentados.

- A documentação que \_\_\_\_\_ nesta tarde está completa, acabei de \_\_\_\_\_ amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. \_\_\_\_\_ ao \_\_\_\_\_.
  - me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; Avisem-me; recebê-la.
  - me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me avisem; recebê-la.
  - enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; Avisem-me; receber-la.
  - enviaram-me; conferi-la; A devolverei; Me avisem; recebê-la.
- Devo ir \_\_\_\_\_ Curitiba \_\_\_\_\_ trabalho na próxima semana. A empresa aérea acabou de confirmar que meu voo sai \_\_\_\_\_ 5 horas da tarde do Aeroporto de Confins. \_\_\_\_\_ vezes costumo me atrasar, sairei de casa mais cedo \_\_\_\_\_ fim de não perder o voo.
  - à; a; às; As; à
  - à; à; às; Às; a
  - a; a; às; Às; a
  - a; a; as; Às; à
- A seqüência em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente é
  - ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
  - ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
  - re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
  - m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
- Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a mesma regra de acentuação em
  - ítem; também; armazéns; contém.
  - Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.
  - calvície; mágoas; errôneos; imundície.
  - desejá-los; ímã; atrás; saída.

	<b>ESPECIALIDADE</b>
<p>11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em</p> <p>(A) aleijar; problema; supertição; etmologia.</p> <p>(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; ponteagudo.</p> <p>(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.</p> <p>(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.</p>	<p>16. No envelhecimento normal espera-se que ocorra</p> <p>(A) aumento da atividade do sistema nervoso autônomo.</p> <p>(B) um retardamento na hialinização dos glomérulos.</p> <p>(C) aumento da água intracelular.</p> <p>(D) aumento da distribuição de drogas lipossolúveis.</p>
<p>12. Todas as palavras são formadas por hibridismo em</p> <p>(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum.</p> <p>(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.</p> <p>(C) monocultura; cilíndrico; amoroso; ajoelhar.</p> <p>(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança.</p>	<p>17. Nos idosos,</p> <p>(A) os efeitos adversos a medicamentos são muito freqüentes, mas a maioria poderia ser evitada.</p> <p>(B) os medicamentos têm menor interação devido a maior distribuição das drogas lipossolúveis.</p> <p>(C) o repouso prolongado predispõe a tromboflebite, obstipação e perda dos reflexos vasomotores posturais.</p> <p>(D) a dosagem de creatinina normal afasta a patologia renal em idosos.</p>
<p>13. O uso de vírgula está INCORRETO em:</p> <p>(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.</p> <p>(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o marido saía de casa.</p> <p>(C) É interessante, a oferta mas não tenho o dinheiro necessário.</p> <p>(D) No meio da confusão, a criança.</p>	<p>18. Em relação ao Estatuto do Idoso, é correto afirmar que os idosos</p> <p>I. que não possam responder por si deverão consultar, na seqüência, o curador, a família e o médico.</p> <p>II. têm direito a desconto mínimo de 50% em eventos culturais e artísticos e apenas 20% nos esportivos e de lazer.</p> <p>III. têm reserva em 10% das unidades em programas habitacionais.</p> <p>Está correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, apenas.</p> <p>(B) I e II, apenas.</p> <p>(C) II e III, apenas.</p> <p>(D) I, II e III.</p>
<p>14. As orações em destaque:</p> <p><i>Esperamos <b>que o novo chefe cumpra seu dever.</b></i></p> <p><i><b>Como estava chateada,</b> não saí de casa.</i></p> <p>Estão corretamente classificadas, respectivamente, em</p> <p>(A) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(C) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração coordenada sindética explicativa.</p> <p>(D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.</p>	<p>19. Nas demências,</p> <p>(A) os antiinflamatórios têm mostrado melhora importante na cognição.</p> <p>(B) os inibidores da acetilcolinesterase estão indicados nas demências avançadas.</p> <p>(C) os tocoferol e selegilina, pela ação antioxidante, parecem ter benefícios.</p> <p>(D) as atitudes preventivas não são consideradas.</p>
<p>15. Ao relacionar a coluna da direita com a da esquerda, numerando as figuras de linguagem, a seqüência correta é</p> <p>I. Eles, o seu único desejo é exterminar-nos. (Garret)      1. pleonasma</p> <p>II. Maria embarcou em um avião gigantesco.      2. anacoluto</p> <p>III. Li Machado de Assis ainda no ginásio.      3. metonímia</p> <p>IV. A mulher não acreditava naquilo que seus próprios olhos viam.      4. catacrese</p> <p>(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1</p> <p>(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3</p> <p>(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2</p> <p>(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1</p>	

<p>20. No acidente vascular cerebral,</p> <p>(A) logo após a oclusão da artéria, se formam duas áreas concêntricas, sendo a externa a área de penumbra.</p> <p>(B) infartos lacunares ocorrem por oclusão dos aneurismas de Charcot-Bouchard.</p> <p>(C) acidente vascular hemorrágico ocorre na região do polígono de Willis.</p> <p>(D) anticoagulação está indicada em isquemias de áreas extensas.</p>	<p>24. Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, morador de rua, foi encontrado desacordado em noite de inverno. Nesse caso,</p> <p>(A) ele deverá ser removido com cuidado, pelo risco de fibrilação atrial e assistolia.</p> <p>(B) o controle da pressão arterial não será considerada importante, se o paciente estiver estável.</p> <p>(C) as medidas de aquecimento central serão necessárias, em temperaturas abaixo de 35 °C.</p> <p>(D) o antibiótico profilático não fará parte do arsenal terapêutico.</p>
<p>21. Em relação às doenças coronarianas,</p> <p>(A) dispnéia de repouso, síncope e confusão mental podem ser um equivalente anginoso.</p> <p>(B) obesidade e sexo masculino são fatores preditores de acidente vascular cerebral em idosos que se utilizam de trombolíticos.</p> <p>(C) infarto silencioso ocorre apenas em idosos diabéticos.</p> <p>(D) pacientes com infarto não Q têm menor incidência de angina recorrente, reinfarcto e morte.</p>	<p>25. Em relação às quedas em idosos, pode-se afirmar que</p> <p>(A) 30% delas resultam fraturas.</p> <p>(B) as mudanças ambientais têm baixo impacto.</p> <p>(C) são multifatoriais na maioria dos casos.</p> <p>(D) têm baixo impacto psicológico nos pacientes.</p> <p>26. Paciente, 75 anos de idade, foi encaminhado ao Pronto-Socorro com queixas inespecíficas de mal-estar e fraqueza há 3 dias. Ao exame físico apresentou-se taquicárdico e com FC = 120 batimentos por minuto. O eletrocardiograma mostrou uma fibrilação atrial de alta resposta. A melhor conduta, nesse caso, é</p> <p>(A) reversão do quadro com amiodarona intravenosa.</p> <p>(B) reversão do quadro com quinidina e digitálico.</p> <p>(C) deixar o paciente sem antiarrítmico, após a reversão da arritmia, devido aos efeitos colaterais a longo prazo.</p> <p>(D) controlar a frequência cardíaca e anticoagular para, posteriormente, realizar a cardioversão.</p>
<p>22. Em relação às demências,</p> <p>(A) as causas reversíveis são hipotireoidismo, doença de Parkinson, hematomas intracranianos, Addison e hidrocefalia de pressão normal.</p> <p>(B) as causas irreversíveis são as doenças: Jakob-Creutzfeldt; de Pick; Alzheimer; de Huntington e vascular.</p> <p>(C) a pseudodemência é a perda das funções cognitivas devido ao uso prolongado de medicações.</p> <p>(D) as doenças infecciosas não as causam.</p>	<p>27. No tratamento da hipertensão, em idosos,</p> <p>(A) o uso de tiazídico perdeu espaço, devido à incontinência urinária.</p> <p>(B) a diminuição do risco cardiovascular e a retenção do cálcio são fatores que facilitam a prescrição de tiazídicos.</p> <p>(C) a hipotensão ortostática é um efeito colateral específico da nifedipina.</p> <p>(D) as drogas de ação central são mais eficazes.</p>
<p>23. Em relação à depressão em idosos,</p> <p>(A) a eletroconvulsoterapia não faz parte do arsenal terapêutico.</p> <p>(B) os inibidores da monoamino-oxidase têm menor possibilidade de permitir as crises hipertensivas.</p> <p>(C) a preferência pelos inibidores da recaptção da serotonina deve-se às menores interações medicamentosas.</p> <p>(D) o suicídio é raro e ocorre mais em mulheres.</p>	<p>28. Os estados confusionais agudos</p> <p>(A) têm incidência maior do que 50% em indivíduos acima de 60 anos de idade hospitalizados.</p> <p>(B) apresentam ocasionalmente os distúrbios hidroeletrólíticos e ácido-básicos.</p> <p>(C) são raros em pós-operatório de cirurgia cardíaca ou ortopédica.</p> <p>(D) podem ser a única manifestação de um infarto do miocárdio.</p>

<p>29. Em relação à anticoagulação em idosos,</p> <p>(A) as indicações são diferentes.</p> <p>(B) deve-se diminuir a dose inicial de varfarin em desnutridos.</p> <p>(C) o risco de sangramento não aumenta após os 60 anos de idade.</p> <p>(D) o valor de INR esperado na anticoagulação é 1,2 a 1,5.</p>	<p>35. Em relação à insuficiência cardíaca,</p> <p>(A) a incidência e prevalência vêm diminuindo com o passar dos anos.</p> <p>(B) o acometimento da função sistólica está sempre presente.</p> <p>(C) a insuficiência diastólica é freqüente nos idosos.</p> <p>(D) os pacientes assintomáticos não devem ser tratados.</p>
<p>30. Em relação à insuficiência renal em idosos,</p> <p>(A) a insuficiência renal aguda pós-operatória é de caráter benigno e totalmente reversível.</p> <p>(B) a síndrome nefrótica é rara na nefropatia por amiloidose.</p> <p>(C) a incidência e a prevalência vêm diminuindo.</p> <p>(D) quando associada à proteinúria de Bence-Jones, pensa-se no diagnóstico de mieloma múltiplo.</p>	<p>36. Paciente, sexo feminino, 70 anos, foi admitida no Pronto-Socorro com quadro de fraqueza e vômitos. De antecedente é hipertensa e estava em investigação para insuficiência coronariana, tendo realizado um cateterismo há 5 dias. Chegou desidratada e confusa. A principal hipótese diagnóstica, nesse caso, é</p> <p>(A) hipoglicemia.</p> <p>(B) insuficiência renal.</p> <p>(C) intoxicação alimentar.</p> <p>(D) encefalopatia hipertensiva.</p>
<p>31. Em neoplasia de cólon,</p> <p>(A) o <i>screening</i> deve ser feito após 50 anos de idade e na presença de retocolite ulcerativa.</p> <p>(B) a pesquisa de sangue oculto fornece pouco falso-positivo.</p> <p>(C) a colonoscopia deve ser feita a cada 5 anos nos pacientes sem fatores de risco.</p> <p>(D) o toque retal é capaz de detectar a maioria dos tumores colorretais.</p>	<p>37. A neoplasia</p> <p>(A) de cólon e mama apresenta a obesidade como fator de risco.</p> <p>(B) de mama, a menarca tardia e a menopausa precoce são fatores predisponentes.</p> <p>(C) de colo de útero deve ser prevenida anualmente, pois a incidência dessa neoplasia aumenta com a idade.</p> <p>(D) gástrica apresenta a gastrite atrófica como fator protetor.</p>
<p>32. Em relação à neoplasia prostática, pode-se afirmar que</p> <p>(A) é a terceira causa de neoplasia em homens.</p> <p>(B) a radioterapia não faz parte do tratamento.</p> <p>(C) a prevenção deve ser feita com a dosagem de PSA a cada 5 anos.</p> <p>(D) as doenças incipientes e de baixo grau podem ser acompanhadas.</p>	<p>38. Paciente, sexo feminino, é encaminhada ao Pronto-Socorro, por adinamia, mal-estar, emagrecimento progressivo e quadro agudo de náuseas e vômitos. Chegou hipotensa e apresentou nos exames iniciais hiponatremia e hipercalemia. Esse caso, provavelmente, refere-se a</p> <p>(A) infecção gastrointestinal.</p> <p>(B) hipocortisolismo.</p> <p>(C) hipertireoidismo.</p> <p>(D) quadro septicêmico.</p>
<p>33. Paciente, sexo feminino, 74 anos de idade, hipertensa e diabética é admitida no Pronto-Socorro, com quadro de dor abdominal súbita. Apresentou-se em mau estado geral, taquicárdica, desidratada, pulso fino, abdome distendido e doloroso à palpação difusamente. Radiografia de abdome sem grandes alterações. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é</p> <p>(A) abdome perfurativo.</p> <p>(B) abdome isquêmico.</p> <p>(C) abdome inflamatório.</p> <p>(D) obstrução intestinal.</p>	<p>39. Em relação às úlceras de pressão,</p> <p>(A) a taxa de mortalidade não é modificada em pacientes internados.</p> <p>(B) raramente evolui para uma infecção sistêmica.</p> <p>(C) a reposição protéico-calórica não altera a evolução do quadro.</p> <p>(D) a infecção freqüentemente é multibacteriana e pode evoluir com infecção óssea.</p>
<p>34. A osteoporose é uma patologia muito freqüente nos idosos. Em relação a essa doença,</p> <p>(A) a fratura mais comum é a de fêmur.</p> <p>(B) os fatores protetores são terapia de reposição hormonal, índice de massa corpórea alto e etilismo.</p> <p>(C) os fatores predisponentes são tabagismo, glucocorticóides e diabetes tipo 2.</p> <p>(D) o aumento de morbidade, mas não o de mortalidade está associado.</p>	<p>40. Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, é encaminhado ao Pronto-Socorro por familiares, com queixa de perda de consciência. Nesse caso,</p> <p>(A) a história e o exame físico adequados são essenciais para direcionar o diagnóstico.</p> <p>(B) a causa vasovagal é importante nessa faixa etária.</p> <p>(C) a miocardiopatia hipertrófica não é causa de síncope.</p> <p>(D) as taquiarritmias podem ser a causa de síncope pelo aumento do débito cardíaco e diminuição do tempo de diástole.</p>