

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto abaixo.

Tecendo a manhã

(João Cabral de Melo Neto)

1

*Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.*

2

*E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.*

- A partir da leitura de todo o poema, depreende-se que ele apresenta
 - a maneira como os galos gritam nas manhãs a fim de fazer com que todos acordem.
 - um fato sem importância que aconteceu em uma manhã qualquer.
 - um trabalho individualizado e que não tem um produto final.
 - a construção solidária de um objeto, de uma obra ou de uma nova sociedade.
- O provérbio que se aplica ao poema é
 - de grão em grão a galinha enche o papo.
 - uma andorinha só não faz verão.
 - cada um por si e Deus por todos.
 - quando um não quer dois não brigam.
- O poema apresenta basicamente as seguintes oposições:
 - individualidade ✕ coletividade e dependência ✕ autonomia.
 - trabalho ✕ ócio e solidariedade ✕ individualidade.
 - produtividade ✕ improdutividade e independência ✕ insegurança.
 - capacidade de criação ✕ falta de criatividade e atividade ✕ inatividade.
- Em **entretendendo** (entretender), nota-se a presença das palavras
 - entender; tenda; estender; entreter.
 - entre; tenda; entender; tender.
 - entre; entristecer; depender; tender.
 - entretendimento; entendimento; tendência; distender.

- Na oração *Um galo sozinho não tece uma manhã*, a palavra em destaque tem a função sintática de
 - sujeito.
 - adjunto adnominal de negação.
 - adjunto adverbial de negação.
 - objeto direto.

- No período *Como havia muitas pessoas na sala, fiquei sufocada*, a palavra **como** é uma conjunção subordinativa
 - comparativa.
 - proporcional.
 - conformativa.
 - causal.

Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa que preenche corretamente, pela ordem, as lacunas dos períodos apresentados.

- A documentação que _____ nesta tarde está completa, acabei de _____ amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. _____ ao _____.
 - me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; Avisem-me; recebê-la.
 - me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me avisem; recebê-la.
 - enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; Avisem-me; receber-la.
 - enviaram-me; conferi-la; A devolverei; Me avisem; recebê-la.
- Devo ir _____ Curitiba _____ trabalho na próxima semana. A empresa aérea acabou de confirmar que meu voo sai _____ 5 horas da tarde do Aeroporto de Confins. _____ vezes costumo me atrasar, sairei de casa mais cedo _____ fim de não perder o voo.
 - à; a; às; As; à
 - à; à; às; Às; a
 - a; a; às; Às; a
 - a; a; as; Às; à
- A seqüência em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente é
 - ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
 - ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
 - re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
 - m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
- Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a mesma regra de acentuação em
 - ítêm; também; armazéns; contém.
 - Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.
 - calvície; mágoas; errôneos; imundície.
 - desejá-los; ímã; atrás; saída.

| | ESPECIALIDADE |
|---|--|
| <p>11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em</p> <p>(A) aleijar; problema; supertição; etmologia.</p> <p>(B) carangueijo; propriedade; beneficiência; ponteagudo.</p> <p>(C) bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.</p> <p>(D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.</p> | <p>16. O exame do estado mental da criança apresenta algumas peculiaridades, EXCETO</p> <p>(A) interação pai, mãe e criança.</p> <p>(B) separação e reunião com os pais.</p> <p>(C) análise qualitativa de estórias.</p> <p>(D) conexão social.</p> |
| <p>12. Todas as palavras são formadas por hibridismo em</p> <p>(A) passatempo; automóvel; embora; zunzum.</p> <p>(B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.</p> <p>(C) monocultura; cilíndrico; amoroso; ajoelhar.</p> <p>(D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança.</p> | <p>17. Sobre os transtornos mentais periictais associados à epilepsia, pode-se afirmar que</p> <p>(A) alguns pacientes não apresentam alterações no EEG.</p> <p>(B) a alteração da consciência é obrigatória.</p> <p>(C) as crises, em geral, apresentam início progressivo.</p> <p>(D) geralmente duram segundos ou minutos, não estando associada a disfunções neuroquímicas.</p> |
| <p>13. O uso de vírgula está INCORRETO em:</p> <p>(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.</p> <p>(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o marido saía de casa.</p> <p>(C) É interessante, a oferta mas não tenho o dinheiro necessário.</p> <p>(D) No meio da confusão, a criança.</p> | <p>18. A droga que, em conjunto com seu metabólito ativo, apresenta meia-vida superior a 48 horas é</p> <p>(A) paroxetina.</p> <p>(B) fluoxetina.</p> <p>(C) sertralina.</p> <p>(D) fluvoxamina.</p> |
| <p>14. As orações em destaque:</p> <p><i>Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.</i></p> <p><i>Como estava chateada, não saí de casa.</i></p> <p>Estão corretamente classificadas, respectivamente, em</p> <p>(A) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.</p> <p>(C) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração coordenada sindética explicativa.</p> <p>(D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.</p> | <p>19. Pacientes com Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade freqüentemente recebem estimulantes para o manejo dos sintomas, com alguns efeitos colaterais. Nesse caso, é INCORRETO afirmar que</p> <p>(A) a pemolina é uma alternativa para o tratamento de anorexia e perda de peso.</p> <p>(B) pacientes apresentando tontura podem apresentar melhora com a prescrição de estimulantes sob a forma de longa ação.</p> <p>(C) a presença de insônia e pesadelos pode ser a indicação de uso de antidepressivos como tratamento adjuvante.</p> <p>(D) a dose de metilfenidato diária não deve ultrapassar 50 mg/dia.</p> |
| <p>15. Ao relacionar a coluna da direita com a da esquerda, numerando as figuras de linguagem, a seqüência correta é</p> <p>I. Eles, o seu único desejo é exterminar-nos. (Garret) 1. pleonasma</p> <p>II. Maria embarcou em um avião gigantesco. 2. anacoluto</p> <p>III. Li Machado de Assis ainda no ginásio. 3. metonímia</p> <p>IV. A mulher não acreditava naquilo que seus próprios olhos viam. 4. catacrese</p> <p>(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1</p> <p>(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3</p> <p>(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2</p> <p>(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1</p> | <p>20. A testagem psicológica formal de inteligência e personalidade é parte integrante da prática clínica. São testes de avaliação de personalidade, EXCETO</p> <p>(A) Escala WAIS.</p> <p>(B) Teste de Rorschach.</p> <p>(C) Técnica de Associação de Palavras.</p> <p>(D) Inventário Clínico Multiaxial de Milton.</p> |
| | <p>21. NÃO é sintoma da intoxicação por cocaína</p> <p>(A) taquicardia.</p> <p>(B) confusão mental.</p> <p>(C) agitação psicomotora.</p> <p>(D) constrição de pupilas.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>22. Apesar de diversos efeitos colaterais e interações medicamentosas, os inibidores da MAO, em especial a tranilcipromina, são antidepressivos ainda usados por diversos pacientes. Nesse caso, é INCORRETO afirmar que</p> <p>(A) feocromocitoma é uma contra-indicação absoluta.</p> <p>(B) 40% a 60% dos pacientes desenvolvem hipotensão postural.</p> <p>(C) freqüentemente pacientes podem desenvolver crises hipertensivas espontâneas.</p> <p>(D) a meia-vida da tranilcipromina é de 1 a 3 horas, mas a dieta (com restrição de alimentos ricos em tiramina) deve ser mantida por, pelo menos, 14 dias após a sua suspensão.</p> | <p>27. A confabulação</p> <p>(A) é um processo consciente de preenchimento de lacunas de memória.</p> <p>(B) é a distorção afetiva da memória do paciente.</p> <p>(C) é associada a transtornos mentais orgânicos.</p> <p>(D) está associada à repressão de impulsos ou idéias consideradas inaceitáveis.</p> |
| <p>23. As síndromes de Wernicke e de Korsakoff estão associadas à deficiência vitamínica, freqüente em pacientes com maus hábitos alimentares ou problemas absorptivos. Nesse caso,</p> <p>(A) o tratamento da síndrome de Korsakoff é realizado com a administração de tiamina 100 mg, via oral, duas vezes ao dia, com sucesso em 50% a 70% dos pacientes.</p> <p>(B) é prescrita a administração de tiamina associada à glicose.</p> <p>(C) a encefalopatia alcoólica, também chamada de síndrome de Korsakoff, é um transtorno neurológico cujos sintomas incluem ataxia, confusão e anormalidade na motilidade ocular.</p> <p>(D) a síndrome de Wernicke pode desaparecer espontaneamente em alguns dias ou semanas.</p> | <p>28. O comportamento sexual é diversificado e determinado por uma interação complexa de fatores, como circunstâncias de vida, cultura e relacionamentos interpessoais dos indivíduos. Nesse caso,</p> <p>(A) os diuréticos podem estar associados a alterações ejaculatórias.</p> <p>(B) as mulheres raramente apresentam transtornos de excitação sexual.</p> <p>(C) a dispareunia raramente é associada a fatores dinâmicos.</p> <p>(D) para o diagnóstico de fetichismo, não é necessário que o paciente apresente qualquer tipo de sofrimento.</p> |
| <p>24. O sistema de neurotransmissão associado à melhora de sintomas psicóticos, em pacientes em uso de antipsicóticos, é o</p> <p>(A) histaminérgico.</p> <p>(B) dopaminérgico.</p> <p>(C) noradrenérgico.</p> <p>(D) colinérgico.</p> | <p>29. Paciente, em uso de amitriptilina 50 mg/dia prescrita por clínico em Pronto-Socorro para insônia apresenta, ainda, há 2 meses, tristeza, angústia, ansiedade, anedonia, pensamentos de morte sem ideação suicida, lentificação e aumento do peso. Apresenta como antecedentes pessoais hipertensão (uso de captopril 75 mg/dia), bloqueio de ramo direito assintomático e hipotireoidismo (uso de levotiroxina 37,5 mcg/dia). Nas quatro semanas que está usando a medicação apresentou xerostomia, com melhora parcial dos sintomas. Nesse caso, a conduta correta é</p> <p>(A) suspensão da amitriptilina e introdução de nortriptilina 50 mg/dia para manejo do peso da paciente e efeitos anticolinérgicos.</p> <p>(B) aumento da amitriptilina até 100 mg/dia.</p> <p>(C) suspensão do antidepressivo, introdução de clonazepam 2 mg/dia e encaminhamento para terapia.</p> <p>(D) suspensão do antidepressivo, introdução de paroxetina 20 mg/dia e encaminhamento para terapia.</p> |
| <p>25. O autor da descrição <i>Psicose Maníaco Depressiva</i> e o principal diagnóstico diferencial, respectivamente, são</p> <p>(A) Kraepelin e demência precoce.</p> <p>(B) Bleuler e esquizofrenia.</p> <p>(C) Bonet e melancolia.</p> <p>(D) Schneider e esquizofrenia.</p> <p>26. Sobre os estágios do desenvolvimento sexual, o</p> <p>(A) estágio uretral foi descrito por Freud como transacional entre os estágios fálico e genital, em que a criança passa por um período de inatividade no esquema do desenvolvimento.</p> <p>(B) estágio fálico se caracteriza por um foco primário do interesse sexual, estimulação e excitação sexual.</p> <p>(C) estágio anal está associado à capacidade de dar e receber sem excessiva dependência ou inveja, sentimentos de confiança e segurança próprios, e integração da identidade.</p> <p>(D) termo utilizado para a resolução de uma determinada fase do desenvolvimento pré-genital é fixação.</p> | <p>30. Em relação a Tab I e depressão nos EUA, pode-se afirmar que, em termos de gênero,</p> <p>(A) em TAB I, homens e mulheres são igualmente acometidos.</p> <p>(B) na depressão, homens e mulheres são igualmente acometidos.</p> <p>(C) em TAB I, para cada 3 mulheres existe um homem acometido.</p> <p>(D) na depressão, para cada 3 mulheres existe um homem acometido.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>31. O bloqueio dopaminérgico tipo D2 provoca</p> <p>(A) alucinações, distonia e boca seca.</p> <p>(B) distonia, disfunção sexual e crise oculógira.</p> <p>(C) boca seca, distonia e demais síndromes extrapiramidais.</p> <p>(D) distonia, crise oculógira e boca seca.</p> | <p>37. Durante a preparação para a eletroconvulsoterapia, a injeção de atropina é considerada interessante para</p> <p>(A) o relaxamento muscular do paciente.</p> <p>(B) a diminuição de secreções orais e respiratórias.</p> <p>(C) evitar taquicardia ventricular que pode ser desencadeada pela corrente elétrica.</p> <p>(D) a anestesia do paciente.</p> |
| <p>32. O transtorno factício é caracterizado por sintomas produzidos</p> <p>(A) inconscientemente e traz sofrimento intenso ao paciente.</p> <p>(B) inconscientemente e não traz prejuízo ao paciente.</p> <p>(C) conscientemente e com ganhos em <i>estar doente</i>.</p> <p>(D) conscientemente e com ganhos secundários diversos.</p> | <p>38. São exemplos de transtornos de personalidade do cluster C do DSM IV:</p> <p>(A) evitativo e esquizóide.</p> <p>(B) dependente e narcisista.</p> <p>(C) esquizotípico e evitativo.</p> <p>(D) dependente e obsessivo.</p> |
| <p>33. São exemplos de inibidores de monoaminoxidase, EXCETO:</p> <p>(A) selegilina.</p> <p>(B) moclobemida.</p> <p>(C) tranilcipromina.</p> <p>(D) milnaciprano.</p> | <p>39. Paciente cardiopata, portador de válvula metálica, faz uso regular de warfarina. Apresenta fase de mania caracterizando transtorno afetivo bipolar e opta-se pelo uso de carbamazepina, uma vez que o lítio não controlou sua sintomatologia. É uma precaução a ser tomada com tal combinação, o fato de que a carbamazepina</p> <p>(A) aumenta o nível sérico da warfarina, por induzir P450, causando sangramento significativo.</p> <p>(B) aumenta o nível sérico da warfarina, por inibir P450, causando sangramento significativo.</p> <p>(C) diminui o nível sérico da warfarina, por induzir P450, causando diminuição de INR no coagulograma.</p> <p>(D) diminui o nível sérico da warfarina, por inibir P450, causando diminuição de INR no coagulograma.</p> |
| <p>34. Paciente, 27 anos de idade, nos últimos 2 anos vem apresentando quadro de sonolência excessiva durante o dia, incapacitando-a para as atividades habituais. O diagnóstico plausível e o tipo de sintoma para melhor elucidação diagnóstica, respectivamente, são</p> <p>(A) catalepsia e presença de elementos do sono REM entre a transição da vigília e do sono.</p> <p>(B) narcolepsia e intensidade de microdespertares noturnos.</p> <p>(C) narcolepsia e perda de tônus muscular caso passe por emoções intensas.</p> <p>(D) catalepsia e intensidade de microdespertares noturnos.</p> | <p>40. Para descrever um possível sinônimo de esquizofrenia paranóide, caracterizado por delírios bem estruturados, o termo mais adequado é</p> <p>(A) oligofrenia.</p> <p>(B) parafrenia.</p> <p>(C) hebefrenia.</p> <p>(D) esquizotipia.</p> |
| <p>35. São sintomas de intoxicação por canabis:</p> <p>(A) aumento de apetite e boca seca.</p> <p>(B) taquicardia e sialorréia.</p> <p>(C) sialorréia e aumento de apetite.</p> <p>(D) bradicardia e sialorréia.</p> | |
| <p>36. Paciente, sexo feminino, 29 anos de idade, há 3 anos com perda de peso significativa, IMC de 16 e força vômitos para perda de peso, pois se considera <i> muito gorda</i>. Seu provável diagnóstico, dentre as possibilidades abaixo, é</p> <p>(A) transtorno psicótico.</p> <p>(B) bulimia nervosa, subtipo purgativo.</p> <p>(C) anorexia nervosa, subtipo purgativo.</p> <p>(D) bulimia nervosa, subtipo restritivo.</p> | |