

QUESTÃO 01

Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido, podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com Olinda

- A) vendendo gêneros alimentícios.
- B) comprando pedra e cal.
- C) vendendo máquinas e ferramentas.
- D) comprando gêneros alimentícios e escravos
- E) trocando escravos por máquinas e ferramentas.

QUESTÃO 02

A relação entre índios e brancos, na América portuguesa, envolveu complexos processos que oscilavam entre violência e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos portugueses deu-se, principalmente, com a tribo

- A) Xucuru.
- B) Ianomâmi.
- C) Guarani.
- D) Funil-ô.
- E) Caetés.

QUESTÃO 03

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura negra e popular o(a)

- A) Daruê Malungo.
- B) Alafíá.
- C) Conceição das crioulas.
- D) Vodú.
- E) Xangô do Nordeste.

QUESTÃO 04

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial, sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local preservou a história

- A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
- B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os franceses.
- C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus, pedras, panelas, água e pimenta.
- D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça pública.
- E) dos cavaleiros e das cavalcadas medievais, revividas durante o carnaval.

QUESTÃO 05

O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixou-se neste contexto, no século XVI, como

- A) área apenas de criação de gado.
- B) área apenas de produção de cana de açúcar.
- C) área de transição, com feiras de gado.
- D) área mista, com produção de cana e criação de gado.
- E) área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado, quanto para a cana.

QUESTÃO 06

O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas inovadoras para o ambiente americano da época, como a liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau

- A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando espanto na população local.
- B) organizou uma assembleia que teve participação dos índios da região.
- C) criou a primeira sinagoga.
- D) concedeu verbas para os comerciantes.
- E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância para a região.

QUESTÃO 07

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a permanência de certas influências dos holandeses. Goiana, após a expulsão dos holandeses

- A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
- B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo do ouro e pedras preciosas.
- C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram aliados dos habitantes da região.
- D) Mandou índios para participarem em assembleia na capital, para que defendessem seus direitos.
- E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as melhorias realizadas no período anterior.

QUESTÃO 08

Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um ponto importante na separação de Goiana do resto da capitania. A consequência destes protestos foi

- A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de Itamaracá.
- B) a transferência de Goiana para a capitania de Pernambuco.
- C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
- D) o aumento da verba para construção de engenhos em Goiana.
- E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

QUESTÃO 09

A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar traços negativos do governo português no Brasil, defendendo ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do século anterior. A participação de Goiana na Revolução Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)

- A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a financiar os rebeldes.
- B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
- C) abastecimento dos centros revolucionários.
- D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
- E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos goianenses.

QUESTÃO 10

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste processo podemos destacar

- A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia jornais para toda a capitania.
- B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a libertação dos escravos na região.
- C) a atuação da população local, que era radicalmente contra o imperador e seus desmandos.
- D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
- E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra o padroado régio.

RASCUNHO

TEXTO 1

Superstições e crendices

Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As superstições têm origem no início da civilização humana e com ela deverão morrer, pois não há momento na história do mundo em que elas não estejam presentes.

Superstição é também acreditar na existência real dos mitos folclóricos, como o *saci*, a *mula sem cabeça*, o *lobisomem*, as *bruxas*, e em *feitiços jogados*, *mau-olhado* ou *olho gordo*. Mas há crendices que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para obter dentes fortes, dentre outras.

Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são muito antigas e têm uma grande importância na vida dos povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare (veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.

Há uma quantidade enorme de superstições conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas crendices.

- Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.
- Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.
- Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.
- Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.
- Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.

ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. *Português*. 7º ano. São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

QUESTÃO 11

Com o Texto 1, seu autor pretende:

- A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em determinadas crenças existentes nas culturas de diversos povos.
- B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
- C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem das crenças e superstições existentes em vários países.
- D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser humano, por meio da compreensão de suas crenças.
- E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

QUESTÃO 12

Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a essa diversidade, o texto nos informa que:

- A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o medo que esses mitos despertam na população.
- B) a crença em *mau-olhados* e *olhos gordos* são derivadas de outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
- C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas, que não têm um caráter preventivo ou de medo.
- D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do ensino formal.
- E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não deve participar de enterros, para proteger seu filho.

QUESTÃO 13

Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de acordo com o Texto 1 a seguinte informação:

- A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não apresentam relação direta com o que cada cultura tem de característico.
- B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e torná-lo mais sofrido para a mulher.
- C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem faz o parto.
- D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar enterros na África, porque criam que a alma do morto perseguiria a mãe para sempre.
- E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o risco de serem infectadas.

QUESTÃO 14

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da vida que gerou nos homens crenças supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
- B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
- C) No trecho: “Mas há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a função de indicar continuidade na linha argumentativa do texto.
- D) No trecho: “há credences que não implicam medo ou defesa de algum mal, como por exemplo”, a expressão destacada antecede a enumeração de elementos que exemplificam o que foi afirmado.
- E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas credences”, o termo destacado aponta para um elemento exterior ao texto.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta no enunciado dado.

- A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
- B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.” (EXPLICAÇÃO)
- C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.” (CONSEQUÊNCIA)
- D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes do caixão.” (CONDIÇÃO)
- E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá azar.” (CAUSALIDADE)

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está corretamente acentuada.

- A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
- B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada dá azar.
- C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem assustá-los.
- D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a banana.
- E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

TEXTO 2

O “papa-figo”

Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo. Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um lobisomem.

Até que um negro velho, empregado da família, falou para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é, fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos: quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam, dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.

Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor melhorou.

[...]

Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_
Acesso em 27/03/2010. Adaptado.

QUESTÃO 17

O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero, estão nele expressas as seguintes:

1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e tradições de um povo, além de carregado de representações simbólicas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 2.
- E) 1 e 4.

QUESTÃO 18

Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2, analise as proposições a seguir.

1. O trecho: “*Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.*” é iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “*Os médicos falavam de uma “doença do sangue”, só que não conseguiram encontrar uma medicação eficiente.*”, a expressão destacada indica oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “*Até que um negro velho, empregado da família, falou...*”, a expressão destacada tem valor temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.

Estão **corretas**:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa em que as regras da concordância (verbal e nominal) foram obedecidas.

- A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menos pessoas acreditam nelas.
- B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas de vários países.
- C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de arrepiar!
- D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios medos e superstições.
- E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas no tempo.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está **correta**.

- A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor melhorou”. (METÁFORA)
- B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”. (METONÍMIA)
- C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”. (EUFEMISMO)
- D) “quanto mais gordos e corados, melhor”. (PLEONASMO)
- E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Sobre a Esclerose Múltipla (EM), analise cada uma das afirmações abaixo e indique V quando verdadeira ou F quando falsa:

- () Sua fisiopatologia pode estar ligada a uma infecção viral quando o vírus tiver sua estrutura semelhante a proteínas mielínicas. Esse processo pode desencadear uma reação imune que inicia a doença
- () As lesões ocorrem geralmente na substância cinzenta, nervo óptico, tratos corticocerebelares e corno anterior da medula.
- () Os sintomas cerebelares e bulbares que podem ocorrer são: dificuldade de deglutição, tremor de repouso, nistagmo e alterações do controle respiratório.
- () Na EM progressiva primária, há uma continuidade na deteriorização do quadro clínico, com permanência constante dos sintomas.
- () O principal comprometimento motor no quadro clínico apresentado leva à Síndrome do Neurônio Motor Superior, que se caracteriza, nessa doença, por paresia, hipotonia e reflexos tendinosos diminuídos.

A sequência está **correta** em:

- A) F, V, F, V, V
- B) F, F, V, F, F
- C) V, F, F, V, F
- D) V, V, F, F, F
- E) V, F, V, F, V

QUESTÃO 22

As atividades precoces no leito com um paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) devem centrar-se:

- A) no treinamento de deambulação, rolamento, postura sentada.
- B) treinamento de AVDs, deambulação, rolamento.
- C) rolamento, postura sentada, posicionamento no leito.
- D) rolamento, ortostatismo, postura em ponte.
- E) treinamento de AVDs, ortostatismo, deambulação.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que corresponde à conduta fisioterápica no pós-operatório, nas primeiras 24 horas, em paciente submetido a artroplastia do quadril, considerando a idade de 75 anos.

- A) Orientação de postura sentada para melhorar a vascularização do membro inferior comprometido.
- B) Iniciar o rolamento precoce no leito para mais rápido iniciar a deambulação.
- C) Neste período deve-se respeitar a idade e manter em repouso absoluto o membro inferior comprometido.
- D) Paciente deitado em decúbito dorsal, mantendo abdução dos membros inferiores e a rotação neutra, iniciar trabalho isométrico de grande glúteo, de quadríceps e os movimentos de flexão dorsal e plantar e de flexo-extensão dos pododáctilos.
- E) Paciente deitado em decúbito lateral sobre o lado são, realizar trabalho isométrico para o grande e médio glúteo, adutores e rotadores externos do quadril, além do trabalho isotônico para todos os movimentos do pé.

QUESTÃO 24

Considere-se que um fisioterapeuta, após uma avaliação fisiofuncional, indique para um paciente portador de artrite reumatoide o uso noturno de uma órtese punho-mão e dedos, em posição funcional. Nesse caso, a prescrição feita pelo fisioterapeuta tem como objetivo:

- A) corrigir deformidades rígidas das articulações de punho e dedos.
- B) manter articulações com distribuição de força e alinhamento articular.
- C) manter alinhamento muscular com consequente aumento de força.
- D) corrigir deformidades móveis ao gerar padrão neutro de posição do punho-mão.
- E) manter alinhamento muscular com consequente aumento de resistência.

QUESTÃO 25

Considere-se que um paciente com diagnóstico de tendinite patelar unilateral tenha recebido indicação de exercício terapêutico do tipo contração muscular excêntrica em cadeia fechada. Nesse exercício, o fisioterapeuta deve orientar o paciente a:

- A) flexionar o joelho, iniciando a partir da posição de pé e joelho em extensão, com apoio unipodal.
- B) estender o joelho na mesa de Bonet, com carga progressiva.
- C) estender o joelho, iniciando a partir da posição de pé e joelho semifletido, com apoio unipodal.
- D) permanecer sentado, com apoio de uma almofada sob o joelho, e estender o joelho nos últimos graus de extensão.
- E) flexionar o joelho em amplitude de 20° a partir da posição de decúbito ventral.

QUESTÃO 26

Considere-se que um paciente submetido a uma pateleotomia total tenha sido encaminhado para tratamento fisioterapêutico. Em função da alteração anatômica gerada por esse tipo de procedimento cirúrgico e sua consequente alteração biomecânica, é **correto** afirmar que esse paciente, na atuação do músculo quadríceps, apresentará:

- A) perda de flexibilidade.
- B) ganho de extensibilidade.
- C) perda de torque.
- D) ganho de flexibilidade.
- E) perda de extensibilidade.

QUESTÃO 27

A Hanseníase permanece como questão relevante do ponto de vista da Saúde Pública, continua a produzir mais de 40 mil casos novos/ano no Brasil mantendo importante endemicidade e manifesta-se por meio de:

- A) incapacidade física e neurológica, dor.
- B) febre, dor na garganta e tosse.
- C) nódulos, dores nas articulações e febre.
- D) manchas brancas na pele com grande sensibilidade a dor.
- E) lesões de pele que se apresentam com diminuição ou ausência de sensibilidade.

QUESTÃO 28

Quanto à distopia genital, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O prolapso genital é fruto de um desequilíbrio das forças que confinam o útero e os demais órgãos ao interior da pelve.
- B) O prolapso de alças intestinais é chamado de enterocele, enquanto que o de bexiga é chamado de cistocele.
- C) O prolapso uterino incide, de preferência, em mulheres idosas e multíparas.
- D) Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS) a distopia deve ser classificada através da medida do hiato genital, do corpo perineal, do comprimento total da vagina e pela localização de seis pontos de referência: Aa, Ba, C, D, Ap e Bp.
- E) O ponto Aa fica localizado na linha média da parede vaginal posterior, 3 cm acima do meato externo da uretra. Em relação ao hímem, sua posição poderá variar de +3cm a -3cm.

QUESTÃO 29

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS/1996, assinale a alternativa que **não** corresponde ao papel do Gestor Federal:

- A) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
- B) Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual.
- C) Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional.
- D) Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional.
- E) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus municípios, sempre na perspectiva da atenção integral.

QUESTÃO 30

Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde -NOAS-SUS 01/2001 assinale “v” quando verdadeiro ou “F” quando considerar falso:

- () Um sistema de saúde equânime, integral, universal, resolutivo e de boa qualidade concebe a atenção básica como parte imprescindível de um conjunto de ações necessárias para o atendimento dos problemas de saúde da população, indissociável dos demais níveis de complexidade da atenção à saúde
- () São consideradas áreas de atuação estratégicas mínimas para habilitação na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada: o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal
- () A Atenção de Média Complexidade – MC – compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país.
- () A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade solidária entre Secretarias de Estado e do município
- () A ampliação das responsabilidades dos municípios na garantia de acesso aos serviços de atenção básica, a regionalização e a organização funcional do sistema são elementos centrais para o avanço do processo.

A sequência está **correta** em:

- A) V, V, V, V, F
- B) V, V, V, F, V
- C) V, F, V, F, F
- D) F, V, F, F, F
- E) F, V, V, V, F

QUESTÃO 31

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB- SUS/1996, no que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir:

1. assistência pré-natal, parto e puerpério.
2. acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.
3. cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.
4. agendamento para a aposentadoria programada.
5. tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.

São verdadeiros apenas os itens

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3, 4 e 5.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 1, 2, 3 e 5.
- E) 2, 3 e 4.

QUESTÃO 32

A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) ou Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é um dos quadros mais comuns encontrado na unidade de terapia intensiva e que exige a atuação da fisioterapia respiratória. No paciente acometido de SARA podemos encontrar:

1. Alterações da relação V/Q, que são consideradas desigualdades da relação ventilação perfusão
2. O pulmão rígido
3. Hiperoxia
4. Redução da capacidade residual funcional

Estão **corretas** apenas

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2 e 3.

QUESTÃO 33

Do ponto de vista de intervenção da fisioterapia os parâmetros gasométricos são considerados importante recurso para avaliar a condição clínica do paciente. Em relação à curva de dissociação da hemoglobina, qual das alternativas abaixo representa um fator que determina a diminuição da afinidade da molécula de oxigênio pela hemoglobina?

- A) Redução do pH sanguíneo
- B) Elevação acentuada do pH sanguíneo
- C) Redução da PaCO₂
- D) Elevação da temperatura corporal
- E) pH sanguíneo a 7,4

QUESTÃO 34

Com relação à avaliação pneumofuncional, marque a alternativa **correta**:

- A) O pico de fluxo expiratório (*peak flow*) mede a força dos músculos inspiratórios.
- B) A manovacuometria deve ser realizada partindo da CRF ou do VR e serve para avaliar o grau de obstrução nos pacientes pneumopatas
- C) A medida do *peak flow* leva em consideração parâmetros como idade, sexo e IMC.
- D) A ventilometria em que é avaliado o volume minuto, compreende os valores de volume corrente e volume de reserva inspiratório baseados na frequência respiratória
- E) Na espirometria o volume expiratório forçado no primeiro minuto (VEF1) e o pico de fluxo expiratório (PFE) expressam o grau de obstrução do paciente

QUESTÃO 35

Paciente asmático grave internado em crise de asma com indicação de realizar nebulizações com drogas broncodilatadoras devido a um quadro de broncoespasmo. Qual a orientação a ser fornecida a este paciente?

- A) A nebulização deve ser feita com altos fluxos a fim de favorecer a chegada das partículas em regiões mais periféricas do pulmão
- B) A solução nebulizada deve conter um volume que favoreça a presença de um volume morto elevado ao final da nebulização
- C) O padrão respiratório deve ser a pequenos volumes e grande frequência para permitir maior deposição do aerossol
- D) Respiração com frequência respiratória reduzida e a presença da pausa inspiratória devem ser orientadas para facilitar a deposição do aerossol
- E) O uso de máscaras é recomendado para favorecer a respiração nasal e aumentar a quantidade de partículas de aerossol que chegam na árvore respiratória

QUESTÃO 36

Na ventilação mecânica assistida são vários modos ventilatórios que devem ser escolhidos e usados de acordo com a condição clínica de cada paciente. Em relação ao modo ventilatório por pressão controlada (PVC) é **incorreto** afirmar:

- A) O volume corrente atingido pelo paciente será diretamente proporcional à resistência do sistema respiratório já que o volume corrente é considerado livre
- B) O volume corrente atingido pelo paciente será inversamente proporcional a resistência do sistema respiratório
- C) O volume corrente atingido pelo paciente será diretamente proporcional à pressão inspiratória ofertada pelo ventilador mecânico
- D) O volume corrente atingido pelo paciente será diretamente proporcional à complacência do sistema respiratório
- E) A pressão do ventilador, a complacência e a resistência do sistema respiratório são os principais determinantes do volume corrente.

QUESTÃO 37

Sobre a assistência ventilatória mecânica, analise cada uma das afirmações abaixo e assinale “V” quando verdadeira ou “F” quando considerar falsa:

- () Para um paciente com SARA em ventilação mecânica não é preconizado ventilação por volumes controlados como forma de modo ventilatório
- () Na situação em que um paciente depende da assistência ventilatória mecânica por mais de 6 horas por dia por um tempo superior a 3 semanas é considerada como sendo ventilação mecânica prolongada
- () Durante o processo de desmame a situação onde o paciente consegue permanecer em respiração espontânea durante pelo menos 48 horas pode ser considerado um parâmetro de sucesso para o desmame da prótese ventilatória
- () O processo de desmame depende da complacência do sistema respiratório, da presença da respiração espontânea por um tempo mínimo de 48 horas e independe da pressão inspiratória
- () No modo ventilatório por volume controlado (VCV) o fluxo é livre, favorecendo melhor adaptação do paciente a prótese ventilatória

A sequência está correta em:

- A) V, V, F, F, V
- B) V, V, V, F, F
- C) V, F, V, F, F
- D) F, V, F, F, F
- E) F, V, V, V, V

QUESTÃO 38

A ventilação não invasiva (VNI) é um dos recursos iniciais de escolha quando o paciente chega ao setor de emergência com desconforto respiratório. Sobre a VNI, analise as afirmações.

1. A VNI através da pressão positiva recruta alvéolos colapsados reduzindo as áreas de *shunt*
2. Durante o processo de exacerbação no paciente DPOC, a VNI pode ser usada aumentando o trabalho respiratório e melhorando as trocas gasosas
3. O Uso da PEEP durante a VNI é recomendada pela possibilidade de reduzir a auto-PEEP do paciente com DPOC durante um quadro de agudização
4. O uso do modo Bi-nível na VNI permite melhor conforto ao paciente e possibilita a redução do trabalho respiratório favorecendo o repouso nos quadros de fadiga da musculatura respiratória

Estão corretas apenas

- A) 1 e 4
- B) 1, 2 e 4
- C) 2 e 4
- D) 1 e 3
- E) 1, 3 e 4

QUESTÃO 39

Com relação aos músculos respiratórios, assinale a alternativa incorreta:

- A) Durante a ventilação os músculos necessitam vencer cargas resistivas e elásticas.
- B) Em pacientes com retificação da cúpula diafragmática, em decorrência do processo de hiperinsuflação, pode ser observado o sinal de Hoover
- C) Durante a contração do diafragma não ocorrem alterações no fluxo sanguíneo, pois as fibras deste músculo apresentam um trajeto paralelo ao trajeto dos vasos.
- D) Durante a fraqueza muscular, o músculo perde a capacidade de gerar força para contrair.
- E) Segundo a propriedade tensão-comprimento dos músculos, mesmo com encurtamento, o músculo ainda é capaz de contrair com força máxima.

QUESTÃO 40

A UTI neonatal é considerada como um dos principais campos de atuação da fisioterapia respiratória e motora. Assinale “V” quando verdadeiro ou “F” quando considerar falso:

- () Disfunção Laríngea/disfagia, paralisia das cordas vocais e entenose laríngea traqueal são complicações pós extubação no neonato.
- () No quadro clínico da síndrome de aspiração do mecônio podemos observar alterações metabólicas como acidose, hipoglicemia, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia.
- () Retificação da cúpula diafragmática, enfisema intersticial pulmonar, pneumotórax e aumento do diâmetro ântero-posterior são alguns dos achados que podem ser observados no exame radiológico da síndrome de aspiração do mecônio.
- () Hipertensão pulmonar, barotrauma pulmonar, pneumotórax, pneumonia infecciosa e displasia broncopulmonar são algumas das complicações da SAM.
- () Exacerbação do reflexo de tosse é uma das complicações comuns observadas no pós extubação do neonato.

A sequência está correta em:

- A) V, V, V, V, F
- B) V, V, V, F, F
- C) V, F, V, F, F
- D) F, V, F, F, F
- E) F, V, V, V, F

QUESTÃO 41

A intervenção da Fisioterapia no quadro das amputações é vasta. Treinamento para uso de prótese e órtese, o preparo do coto, entre outras, são algumas das atuações da fisioterapia nestes pacientes. Sobre a intervenção da Fisioterapia em amputados, analise as afirmações:

1. O edema é evitado com um enfaixamento do coto com atadura gessada, ainda na mesa operatória
2. Quando não for possível o gessamento pela própria natureza da cirurgia, o coto deve se manter enfaixado com ataduras elásticas, pois favorece a uma rápida cicatrização e possibilidade de colocação mais precoce da prótese
3. O paciente amputado de membro inferior deve estar deitado sobre colchões duros e firmes, usando travesseiros sob o coto de coxa ou no cavo poplíteo (sob o joelho), nos cotos de perna.
4. A movimentação do coto e do membro restante deve ser iniciada 24 horas após a amputação, tendo a finalidade de ativar a circulação geral e impedir o descondicionamento

Estão **corretas** apenas

- A) 3 e 4
- B) 1, 2 e 4
- C) 2 e 4
- D) 1 e 3
- E) 1, 3 e 4

QUESTÃO 42

Sobre as infecções do aparelho respiratório, analise as afirmações:

1. Consideram-se infecções do aparelho respiratório superior as infecções da: laringe, nariz, nasofaringe, orofaringe, seios perinasais e ouvido médio
2. As bronquites agudas são infecções do epitélio ciliado dos brônquios, que se caracterizam por uma inflamação aguda com tosse acompanhada de secreções muco purulentas, dispneia moderada e febre inconstante.
3. A contaminação do condensado formado no circuito ventilatório previne a colonização e infecção das vias aéreas e serve como barreira evitando a contaminação da via aérea superior.
4. A utilização de ventilação mecânica prolongada pode ser considerada um dos principais fatores responsáveis pela alta incidência de pneumonia nos pacientes nas UTIs. O decúbito elevado a 45°C e a aspiração contínua de secreções subglóticas diminuem a aspiração de secreção da orofaringe e são algumas das formas de prevenção destas pneumonias

Estão **corretas** apenas

- A) 2 e 4
- B) 1 e 4
- C) 1, 2 e 4
- D) 1 e 3
- E) 1, 3 e 4

QUESTÃO 43

O *cuff* é um dispositivo usado na AVM, que permite a vedação da via aérea durante a ventilação mecânica. O uso de pressões positiva como a PEEP pode em alguns pacientes facilitar a oxigenação além de proteger o parênquima pulmonar. Sobre o uso da PEEP e do *cuff* **não** podemos afirmar

- A) A PEEP quando associada a pressão de suporte constitui uma modalidade assistida de desmame gradual que evita a instabilidade alveolar
- B) Pressões elevadas no *cuff* reduzem o fluxo sanguíneo e favorecem isquemias
- C) O uso da PEEP durante a ventilação mecânica de pacientes neurológicos com hipertensão intracraniana não é recomendado na presença de edema cerebral
- D) O *cuff* tem como objetivo permitir a perda do excesso de volume durante a aplicação da ventilação com pressão positiva e evitar a aspiração do conteúdo gástrico e secreções das vias aéreas superiores
- E) O aumento da oxigenação através do recrutamento da ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados pode ser obtido com a utilização de altos valores de pressão positiva expiratória final (PEEP)

QUESTÃO 44

O paciente idoso deve ser tratado de forma global e respeitando as repercussões fisiopatológicas decorrentes do envelhecimento. São alterações no sistema músculo esquelético comumente observadas no paciente idoso, **exceto**:

- A) retardo na resposta aos estímulos.
- B) aumento do limiar da sensação vibratória.
- C) aumento no número de unidades motoras.
- D) redução no número de fibras tipo II.
- E) redução na velocidade dos movimentos.

QUESTÃO 45

Dentro da rotina da unidade de terapia intensiva é frequente a utilização da assistência ventilatória mecânica (AVM) em casos de pacientes que apresentam falência da musculatura respiratória. Sobre a AVM, a alternativa **incorreta** é

- A) O recrutamento alveolar é um recurso que favorece a melhora da oxigenação destes pacientes assim como a hipercapnia permissiva pode ser benéfica para estes pacientes
- B) O volume minuto do paciente não é garantido pela PSV. O volume corrente é dependente do gradiente pressórico e da mecânica do sistema respiratório do paciente
- C) Na prática clínica em quadro de desmame considerados difíceis, o uso do protocolo de desmame com o tubo “T” permite ao paciente respirar espontaneamente neste tubo por curtos períodos sendo interrompido ao primeiro sinal de fadiga muscular.
- D) A pressão de suporte ventilatório (PSV) é indicada por favorecer a redução do trabalho dos músculos respiratórios favorecendo a recuperação destes músculos nas situações em que não há presença do drive respiratório.
- E) O aumento da oxigenação através do recrutamento da ventilação colateral e da abertura dos alvéolos colapsados pode ser obtida com a utilização de altos valores de pressão positiva expiratória final (PEEP)

QUESTÃO 46

Sobre a intervenção da Fisioterapia nas angiopatias, assinale “V” quando a afirmação for verdadeira ou “F” quando for falsa

- () Os linfedemas de membros superiores são causados, quase sempre, por ressecção de linfonodos sendo o caso de câncer de mama o mais frequente
- () As causas mais comuns dos edemas de membros inferiores são anormalidades congênitas nos linfedemas primários (congênitos, precoces ou tardios) e de infecções de repetição nos casos de linfedemas secundários, provocados por insuficiências venosas crônicas, infecções micóticas ou bacterianas, trombozes venosas profundas, úlceras e traumas.
- () As neoplasias malignas, cujos tratamentos englobam esvaziamentos ganglionares (para-aórticos, pélvicos ou inguinais), sobretudo quando acrescidos de radioterapia, aparecem também como fator etiológico bastante frequente para os linfedemas.
- () Sabendo-se que o linfedema se desenvolve a partir do momento em que a demanda linfática é maior que o escoamento da linfa uma forma de prevenção é aumentar o fluxo linfático, utilizando o bombeamento muscular em atividades físicas regulares, técnicas compressivas, ou de estimulação linfática

A sequência está **correta** em:

- A) V, V, F, V
- B) V, V, V, V
- C) V, F, V, F
- D) F, V, F, F
- E) F, V, V, V

QUESTÃO 47

Sobre o pós operatório de cirurgia tóraco abdominal podemos afirmar:

- A) O diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através do RX. Dentre os achados do RX o borramento de seio costofrênico e presença da curva de Damoiseau sugerem a presença de derrame pleural da radiografia de tórax em incidência pósterio-anterior.
- B) O diagnóstico do derrame pleural pode ser feito através do RX. Dentre os achados do RX a hipertransparência em região pleural e desvio hilar contra-lateral sugerem a presença de derrame pleural da radiografia de tórax em incidência pósterio-anterior.
- C) A presença do sinal da silhueta cardíaca e desvio hilar-ipsi-lateral é um sinal característico da presença de um derrame pleural pós cirúrgico
- D) É comum observar o borramento de seios cardiofrênico e costofrênico com elevação da cúpula diafragmática ipsi-lateral no caso de derrames pleurais
- E) A drenagem postural é indicada para esvaziar os derrames pleurais de grande monta

QUESTÃO 48

Sobre os traumas raquimedulares, indique V quando verdadeira ou F quando falsa:

- () Um paciente com lesão medular na região dos fascículos grácil e cuneiforme vai apresentar alterações de propriocepção e sensibilidade vibratória.
- () Na síndrome de Brow-Sequard, há perda motora e proprioceptiva e ambas são contralaterais à lesão.
- () Um paciente com lesão a nível C7 não anda de cadeira de rodas normal, pois não possui a inervação do músculo tríceps braquial preservada.
- () A lesão a nível de T5 é considerada um paraplegia baixa, e o paciente já é totalmente independente nas AVD's.
- () Um paciente com lesão L3/L4 ainda não pode deambular com tutor curto, pois não tem a musculatura do quadríceps preservada.

A sequência está **correta** em:

- A) V, V, F, F, V
- B) F, V, F, F, V
- C) V, F, V, F, F
- D) V, F, F, V, V
- E) V, F, F, F, F

QUESTÃO 49

Sobre o complexo articular do joelho, analise as afirmações:

1. As rupturas do menisco medial são tão frequentes quanto às do menisco lateral.
2. A inserção da pata de ganso compreende os tendões dos músculos grácil, semitendinoso e semimembranoso.
3. O teste de *McMurray* foi desenvolvido para identificar rupturas posteriores do menisco.

Está(ão) correta(s)

- A) 1, 2 e 3
- B) 1 e 2, apenas
- C) 2 e 3, apenas
- D) 1 e 3, apenas
- E) 3, apenas

QUESTÃO 50

A crioterapia é amplamente usada em várias patologias como recurso fisioterapêutico e dentre os efeitos fisiológicos a hiperemia transitória e a vasoconstricção são alguns dos efeitos observados. Assinale abaixo dentre as patologias qual a que podemos considerar como contraindicação para uso deste recurso:

- A) Doença de Dupuytren
- B) Tendinite de Aquiles
- C) Doença de D' Quervain
- D) Peritendinite calcária
- E) Doença de Raynaud

RASCUNHO

RASCUNHO