



SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA



ABRIL / 2005

MÉDICO ESPECIALISTA (INFECTOLOGISTA) E MÉDICO (GENERALISTA - SOMENTE PARA FMTM)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

PROVAS	QUESTÕES	PONTOS
Língua Portuguesa IV	1 a 5	2,0
	6 a 10	3,0
Conhecimentos Básicos de Medicina e Legislação do SUS	11 a 15	2,0
	16 a 20	4,0
Conhecimentos Específicos	21 a 30	1,5
	31 a 40	3,0

b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:



05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma opção anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares, *paggers* ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

08 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

09 - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

10 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**.

11 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas. Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para o encerramento.



LÍNGUA PORTUGUESA IV

Em busca da felicidade

Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira, o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só comparável a momentos como os da conquista da Copa do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
5 transformar essa euforia efêmera num estado duradouro de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou antidepressivos como os Prozac da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
10 cientistas de diversas áreas estão investigando em várias partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais. Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
15 depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto- astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
20 que sempre se preocupou em minorar dores e padecimentos da alma, mais do que em despertar prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um chato.

25 Eleito em 2000 presidente da Associação Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria se satisfazer apenas em levar um paciente do estado negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
30 zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”. O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
35 se multiplicando é que o peso das relações afetivas na nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma situação financeira favorável, confirmando o que parecia ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade. Além da constatação de que bons sentimentos e valores
40 positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros. E isso porque três em cada quatro casados viam no
45 parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a relação que mais contribui para a construção da felicidade. Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia. Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
50 menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. **O Globo**, 09 fev.05

1

O conceito de felicidade de que fala o título do texto é:

- (A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.

2

Infer-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside no fato de que:

- (A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de felicidade.

3

Indique a opção em que a coluna da direita **NÃO** traz exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda, de acordo com o texto.

(A)	carnaval (l. 2)	fonte de alegria e felicidade coletivas
(B)	antidepressivos (l. 8)	os Prozac da vida
(C)	cientistas de diversas áreas (l. 10)	psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas
(D)	substâncias propiciadoras de alto- astral (l. 17-18)	a dopamina e a endorfina
(E)	bons sentimentos e valores positivos (l. 39-40)	a solidariedade e o otimismo

4

Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do último parágrafos do texto.

- (A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os 20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para o bem-estar do que o amor.

5

A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser adequadamente substituída por:

- (A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6

Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:

- (A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.



7

Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente, ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a opção em que a grafia está correta de acordo com a norma culta.

- (A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
- (B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
- (C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
- (D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
- (E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-humoradas.

8

O trecho que **NÃO** é correto sintaticamente para completar uma frase começada por “Além...” é:

- (A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos, o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
- (B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas causas naturais.
- (C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os resultados das pesquisas, o público em geral também os aplaudiu.
- (D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.
- (E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma solução para a felicidade definitiva, ela também não aponta paliativos.

9

Aponte a opção em que se encontra um uso **INACEITÁVEL** de concordância.

- (A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
- (B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
- (C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
- (D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
- (E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

10

Indique a opção que contém uma oração subordinada que está corretamente introduzida por um pronome relativo.

- (A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser humano é ingerir menos produtos químicos.
- (B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde.
- (C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
- (D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente felicidade são nocivos à saúde.
- (E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

11

Na abordagem ao portador de DST, o aconselhamento é medida importante, sendo um de seus objetivos promover a adesão ao tratamento. O aconselhamento deve ser conduzido por(pela):

- (A) todos os profissionais da equipe de saúde com informações atualizadas sobre DST.
- (B) equipe de enfermeiros com informações atualizadas sobre DST.
- (C) equipe de médicos especialistas em DIP.
- (D) equipe de médicos com informações atualizadas sobre DST.
- (E) equipe de médicos especialistas em Urologia.

12

Em local que não conta com bacterioscopia disponível, é atendido um paciente de 22 anos, com corrimento uretral. A conduta terapêutica indicada é:

- (A) Azitromicina 1 g VO, dose única.
- (B) Azitromicina 1 g, dose única + Doxiciclina 100 mg de 12/12 horas por sete dias.
- (C) Ciprofloxacina 500 mg VO, dose única.
- (D) Eritromicina 500 mg de 6/6 horas por 7 dias + Ofloxacina 400 mg, dose única.
- (E) Cefixima 400 mg VO, dose única + Tianfenicol 2,5 g VO, dose única.

13

Medicina preditiva define a estratégia de realizar predições quanto à possibilidade de determinado paciente desenvolver doença com base em testes com DNA. Exemplo de atuação de medicina preditiva é o(a):

- (A) adenocarcinoma do colo.
- (B) carcinoma medular da tireóide.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) diabetes.
- (E) hipertensão arterial.

14

Os soros anti-peçonhentos são obtidos a partir da imunização de cavalos. Quanto à sua administração, é correto fazer:

- (A) uso prévio de prometazina muscular.
- (B) administração preferencial por via muscular.
- (C) realização de prova intradérmica de rotina.
- (D) aplicação de dose fixa de 5 ampolas.
- (E) aplicação de prednisona via oral por 48h.

15

A quimioprofilaxia para tuberculose está indicada em:

- (A) indivíduos com PPD não reator.
- (B) viragem tuberculínica recente.
- (C) granulocitopenia.
- (D) paciente HIV positivo.
- (E) paciente bacilífero.



16

Após acidente automobilístico, ocorre fratura fechada dos ossos da face. Neste caso, em relação à profilaxia antibiótica, pode-se afirmar que:

- (A) não há indicação de antibioticoterapia profilática.
- (B) há preferentemente indicação de cobertura para gram negativo.
- (C) há indicação de cobertura para anaeróbios.
- (D) há necessidade de antibioticoterapia profilática, após o ato cirúrgico corretivo.
- (E) há necessidade de cobertura para *S. aureus*.

17

A única droga indicada para o tratamento isolado da ascaridíase é:

- (A) albendazol.
- (B) cambendazol.
- (C) levamisole.
- (D) mebendazol.
- (E) pamoato de pirantel.

18

A participação complementar dos serviços privados no Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:

- (A) lei específica.
- (B) contrato ou convênio.
- (C) delegação de competência.
- (D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
- (E) concessão ou permissão de serviços públicos.

19

O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

- I - assistência terapêutica integral;
- II - inspeção de alimentos;
- III - vigilância nutricional;
- IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o de trabalho.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

20

A elaboração de normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde é atribuição:

- (A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
- (B) exclusiva da União.
- (C) exclusiva dos Estados.
- (D) exclusiva do Distrito Federal.
- (E) exclusiva dos Municípios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

Mulher, 53 anos, procurou o médico com queixa de adinamia e cansaço fácil. O exame físico foi normal. O hemograma e a bioquímica estão normais. Os exames sorológicos evidenciaram: Toxoplasmose; IgG e IgM: negativos; CMV: IgG positivo e IgM negativo; Anti-HAV IgG positivo; IgM negativo; Anti-HBS e Anti-HBc IgG positivos; HBSAg negativo; Anti-HCV positivo. Qual o exame de escolha a ser realizado?

- (A) Prova de síntese hepática (eletroforese de proteínas, tempo e atividade de protrombina).
- (B) Exame histopatológico por biópsia hepática.
- (C) Repetir hemograma e realizar T3, T4, TSH.
- (D) RNA/PCR para hepatite B.
- (E) RNA/PCR para hepatite C.

22

Homem, 22 anos, está há 10 dias com febre alta, calafrios, tosse com expectoração purulenta, dor torácica tipo pleurítica evoluindo com hemiplegia à esquerda. Raio X de tórax evidenciou múltiplas lesões nodulares, bilaterais. O tratamento de escolha é:

- (A) Penicilina G cristalina (12-18 milhões) U/24h.
- (B) Anfotericina B – 1mg/kg/IV dia.
- (C) Imipenen – 1 g IV 6/6h.
- (D) Vancomicina (2 g / 24h) + gentamicina (1 mg / kg 8/8h).
- (E) Clindamicina 1,2 g / 24h.

23

A Reação de Jarisch-Herxheimer ocorre:

- (A) durante o tratamento da gonorréia.
- (B) na sífilis, após o início do tratamento com penicilina.
- (C) na contaminação ocular pelo gonococos, em neonato.
- (D) como complicação das uretrites por *Chlamydia*.
- (E) quando há recidiva das lesões de donovanose, se o tratamento é interrompido precocemente.

24

Qual a principal característica da Síndrome de Weil?

- (A) Disfunção hepática severa.
- (B) Disfunção renal.
- (C) Fenômenos hemorrágicos.
- (D) Icterícia.
- (E) Mialgia intensa.



25

A criptococose é micose sistêmica que infecta o homem por:

- (A) inoculação direta.
- (B) via cutânea.
- (C) via inalatória.
- (D) via oral.
- (E) via hematogênica.

26

Assinale a opção que apresenta o que **NÃO** é usado no tratamento da paracoccidiodomicose.

- (A) 5-fluorocitosina.
- (B) Cetoconazol.
- (C) Itraconazol.
- (D) Anfotericina B.
- (E) Sulfamentoxaxol + trimetropin.

27

Soropositiva para o HIV, na 10ª semana de gestação, virgem de tratamento antirretroviral com linfócitos CD4: 430 células e carga viral: 1.000 cópias. A conduta correta é:

- (A) fazer zidovudina, lamivudina, nevirapina na hora do parto.
- (B) aguardar completar 14 semanas e iniciar AZT 600 mg/dia.
- (C) não fazer antirretroviral na gestação.
- (D) iniciar imediatamente: zidovudina, lamivudina e efavirenz.
- (E) iniciar AZT 2 mg/kg VO ao completar 32 semanas de gestação.

28

O diagnóstico diferencial da forma pulmonar crônica da histoplasose é feito com:

- (A) brucelose.
- (B) leishmaniose visceral.
- (C) sífilis terciária.
- (D) tuberculose pulmonar.
- (E) linfomas.

29

Jovem, 19 anos, grávida de 6 meses, apresentou febre, calafrios, cefaléia. Feito o diagnóstico de malária vivax, o tratamento indicado é:

- (A) cloroquina + primaquina.
- (B) cloroquina.
- (C) quinino + tetraciclina.
- (D) quinino + clindamicina.
- (E) antesunato.

30

No empiema pleural o principal germe aeróbio Gram-positivo é o:

- (A) Pseudomonas.
- (B) *H. influenza*.
- (C) Mycoplasma.
- (D) *Klebsiella*.
- (E) *S. aureus*.

31

A profilaxia da endocardite infecciosa está indicada em:

- (A) broncoscopia com broncoscópio rígido.
- (B) entubação endotraqueal.
- (C) cesariana.
- (D) circuncisão.
- (E) implante de marca-passo cardíaco.

32

Quanto à profilaxia para micobacteriose atípica em pacientes com SIDA está correto afirmar que:

- (A) está indicada quando CD4 é ≤ 150 células.
- (B) deverá ser feita com azitromicina 1g/dia.
- (C) pode ser feita com claritromicina 1.200 mg/dia.
- (D) pode ser feita com azitromicina 1.200 mg 1 vez na semana.
- (E) não oferece benefício para pacientes em uso de HAART.

33

Com relação às cefalosporinas, pode-se afirmar que:

- (A) cefaclor, cefalotina e cefalozina são de primeira geração.
- (B) possuem ação antipseudomonas: ceftazidime, cefoperazona e cefotaxima.
- (C) a cefazolina é muito empregada como profilaxia de infecção cirúrgica devido à sua meia-vida mais longa.
- (D) a cefazolina atinge concentração local adequada em SNC, sendo uma boa opção para meningite por enterococos.
- (E) todo paciente alérgico à penicilina também o é às cefalosporinas.

34

Quanto à varicela está correto afirmar que a:

- (A) vacina contra varicela é derivada de uma cepa morta do vírus herpes zoster.
- (B) vacina está indicada para gestantes que tenham tido contato recente com a varicela.
- (C) vacinação contra varicela está contra-indicada em grávidas e imunodeprimidos.
- (D) vacinação para varicela é contra-indicada para crianças até 13 anos.
- (E) infecção secundária de pele é uma complicação que deve ser tratada com cuidados locais.

35

O tratamento de escolha para paciente com SIDA e Herpes Zoster é:

- (A) ganciclovir – 10 mg/kg EV a cada 8 horas 7 – 14 dias.
- (B) fanciclovir – 750 mg VO 3 vezes ao dia 7 dias.
- (C) aciclovir – 10 mg/kg EV a cada 8 horas 7 – 14 dias.
- (D) valaciclovir – 1 g VO 3 vezes ao dia 7–14 dias.
- (E) valaciclovir – 500 mg VO 3 vezes ao dia 7–14 dias.



36

O tratamento de primeira escolha para giardíase em adulto é:

- (A) tiabendazol – 01 comp. VO 08/08 horas por 3 dias.
- (B) mebendazol – 01 comp. VO 12/12 horas por 5 dias.
- (C) metronidazol – 1.200 mg/dia por 10 dias.
- (D) albendazol – 02 comp./dia dose única.
- (E) secnidazol – 2 g dose única.

37

Meningite bacteriana aguda por germe Gram-negativo entérico em adulto está associada com:

- (A) abscesso dentário.
- (B) mastoidite.
- (C) otite média aguda.
- (D) otite média crônica.
- (E) fratura fechada de base de crânio com fístula liquórica.

38

Homem, 22 anos, apresentou icterícia, náuseas, vômitos, febre 38 °C, astenia e anorexia. Os marcadores para hepatites virais foram: Anti-HAV IgG e IgM: negativos; HBSAg: positivo; Anti-HBc IgM: positivo; Anti-HBe: negativo; HBe: positivo; Anti- HBS: negativo. O significado clínico desses marcadores é infecção:

- (A) aguda pelo vírus A.
- (B) aguda pelo vírus B, fase replicativa.
- (C) aguda pelo vírus B, fase não replicativa.
- (D) passada pelo vírus E.
- (E) passada em fase não replicativa do vírus B.

39

Mulher, 65 anos, com dor tipo cólica em hipocôndrio direito, de início súbito, com piora progressiva irradiando para ombro direito, náuseas, vômitos, febre, calafrio. Ao exame físico, apresenta dor à palpação de hipocôndrio direito, Sinal de Murphy positivo, peristalse diminuída. Hemograma com 12 mil leucócitos com 8 bastões. Raio X simples de abdome não mostra ar livre em cavidade. Ultra-sonografia mostra vesícula biliar com parede espessada e microcálculos em seu interior. O esquema antibiótico de escolha para o tratamento do processo agudo é:

- (A) azitromicina + tetraciclina.
- (B) claritromicina + amicacina.
- (C) ampicilina + gentamicina.
- (D) cefuroxina + azitromicina.
- (E) imipenem.

40

Na leishmaniose cutâneo-mucosa, com lesões múltiplas de pele, a disseminação do parasita é feita por:

- (A) via sanguínea.
- (B) via linfática.
- (C) via aérea.
- (D) auto-inoculação.
- (E) contigüidade.