



**SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS**  
Edital n. 01/2009  
**PNEUMOLOGIA**  
Código 136

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
**Elas fazem parte da sua prova.**

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

**ATENÇÃO:** Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

**DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

## ➤ Conhecimentos Gerais

### CIRURGIA GERAL

#### Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

#### Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

#### Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

#### Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

# CLÍNICA MÉDICA

## Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

## Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

## Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

### Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

#### COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

#### COLUNA II

- ( ) Agravamento de insuficiência arterial periférica
- ( ) Edema
- ( ) Menor efeito em negros
- ( ) Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

# GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

## Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

## Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptção de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

### Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

### Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- ( ) O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- ( ) O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- ( ) O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)



## ➤ PEDIATRIA

### Questão 13

Em crianças, a téttrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

### Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

### Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

### Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

# SAÚDE PÚBLICA

## Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

### COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

### COLUNA II

- ( ) Odds Ratio  
( ) Risco Relativo  
( ) Razão de Médias  
( ) Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)  
B) (4) (2) (3) (1)  
C) (3) (4) (2) (1)  
D) (3) (1) (2) (4)

## Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.  
B) caso-controle.  
C) coorte histórica.  
D) ecológico.

### Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

### Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

## ➤ Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Paciente masculino, 43 anos, evolui com quadro de Sarcoidose estágio radiológico IV. Apresenta quadro de hemoptise. A causa **mais provável** seria:

- A) Bronquiectasias.
- B) Malformação A-V.
- C) Micetoma.
- D) Bronquite hemorrágica.

### Questão 22

A associação de Silicose e Tuberculose tem sido reconhecida. São fatores que influenciam o desenvolvimento de Tbc em pacientes com Silicose, **EXCETO**

- A) severidade e tipo da Silicose.
- B) idade.
- C) estado de imunodeficiência dos trabalhadores.
- D) presença de bronquiectasias.

### Questão 23

A causa **mais comum** de hemotórax não traumático é

- A) doença pleural maligna.
- B) uso de anticoagulantes.
- C) malformação A-V.
- D) tumores mediastinais.

### Questão 24

Paciente de 60 anos, masculino, foi submetido a cirurgia ortopédica (fratura de fêmur). Apresentou quadro de dor torácica e dispneia súbita, além de taquicardia, cinco dias após a cirurgia. Relatava passado de TVP. Foi submetido a dosagem de dímero D que se mostrou NORMAL.

Em relação a esse caso, é **CORRETO** afirmar que

- A) o diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar foi excluído.
- B) o dímero D, nesse caso, foi equivocadamente solicitado.
- C) o dímero D é um exame de alta especificidade e baixa sensibilidade.
- D) o dímero D é um exame que deveria ser solicitado de maneira seriada.

### Questão 25

Em relação à hipertensão pulmonar do Tromboembolismo pulmonar crônico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes apresentam envolvimento de mais de 40% do leito vascular pulmonar comprometido.
- B) Dispneia é um sintoma que é comum, associada a síncope e dor torácica posterior ao exercício físico.
- C) A capacidade de difusão do monóxido de carbono, dentro de valores normais, exclui o diagnóstico.
- D) A tromboendarterectomia pulmonar é considerada em pacientes sintomáticos, com comprometimento hemodinâmico ou ventilatório em repouso ou em exercício.

### Questão 26

Assinale a patologia em que o ANCA p **está presente**.

- A) Asma brônquica
- B) Síndrome de Churg-Strauss
- C) Granulomatose de Wegener
- D) Síndrome de Goodpasture

### Questão 27

As principais manifestações pulmonares da Síndrome de Behçet são as seguintes, **EXCETO**

- A) aneurisma de artéria pulmonar.
- B) tromboembolismo pulmonar.
- C) pleurite.
- D) pneumonia intersticial linfocítica.

### Questão 28

São patologias relacionadas ao tabagismo, **EXCETO**

- A) câncer de pulmão.
- B) DPOC.
- C) infecções viróticas e bacterianas.
- D) pneumonia de hipersensibilidade.

### Questão 29

Entre as doenças intersticiais pulmonares citadas, a que responde **melhor** ao tratamento com corticoide é a

- A) Pneumonia intersticial usual.
- B) Pneumonia intersticial aguda.
- C) Pneumonia intersticial descamativa.
- D) Pneumonia organizada criptogênica.

### Questão 30

Assinale a medicação que é considerada droga de segunda linha, no tratamento da cessação do tabagismo.

- A) Bupropiona
- B) Adesivos de nicotina
- C) Clonidina
- D) Lorazepan

### Questão 31

A causa **mais comum** de quilotórax é

- A) Linfoma.
- B) Sarcoma de Kaposi.
- C) Trauma torácico.
- D) Ser congênito.

### Questão 32

Assinale o tempo médio para se adquirir estabilidade clínica no paciente com Pneumonia comunitária.

- A) Dois dias
- B) Três dias
- C) Quatro dias
- D) Cinco dias

### Questão 33

Em relação à Candidíase pulmonar, é **CORRETO** afirmar que

- A) a presença de cândida no lavado broncoalveolar é determinante para o diagnóstico de certeza.
- B) os exames sorológicos serão de grande valia para o diagnóstico.
- C) a demonstração histológica de invasão tissular é necessária para o diagnóstico.
- D) os achados radiológicos são patognomônicos para o diagnóstico.

### Questão 34

Em relação à deficiência de Alfa 1 antitripsina e DPOC, é **CORRETO** afirmar que

- A) o enfisema é, predominantemente, centrilobular.
- B) a doença se manifesta, a partir dos 50 anos, no paciente tabagista e com deficiência de Alfa 1 antitripsina.
- C) o enfisema predomina nos lobos superiores.
- D) os sintomas e sinais da doença pulmonar, raramente, se desenvolvem, antes dos 25 anos de idade.

### Questão 35

São sinais de crise aguda severa de Asma, **EXCETO**

- A) alteração do sensório.
- B) presença de retrações intercostais e de esternocleidomastóideo.
- C) intensidade dos sibilos.
- D) fala entrecortada.

### Questão 36

São patologias com predominância de linfócitos no lavado broncoalveolar, **EXCETO**

- A) tuberculose.
- B) sarcoidose.
- C) pneumonia de hipersensibilidade.
- D) hemorragia alveolar.

### Questão 37

São bactérias prevalentes em Pneumonia comunitária do paciente etilista, **EXCETO**

- A) *pseudomonas aeruginosa*.
- B) *streptococcus pneumoniae*.
- C) *klebsiella pneumoniae*.
- D) anaeróbios.

### Questão 38

Em relação à Pneumonia por *Chlamydia psittaci*, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Está relacionada a fezes de morcego.
- B) O tratamento com doxiciclina é recomendado.
- C) A presença de consolidação lobar ao Rx de tórax é comum.
- D) A duração do tratamento é em torno de sete dias.



### Questão 39

Em relação ao tratamento da Tuberculose pleural, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) O tratamento é realizado com rifampicina, pirazinamida e isoniazida, por nove meses.
- B) Está bem estabelecido o uso de corticoide associado a tuberculostáticos.
- C) O tratamento visa, não apenas a debelar o quadro atual, mas prevenir complicações futuras.
- D) Pode-se acrescentar etambutol ao tratamento, dependendo da extensão do derrame pleural.

### Questão 40

Entre as seguintes drogas usadas no tratamento de Tuberculose, assinale a que age **melhor** em bacilos intracelulares e em meio ácido.

- A) Pirazinamida
- B) Estreptomicina
- C) Isoniazida
- D) Rifampicina

### Questão 41

O sintoma **mais comum** da Síndrome de Pancoast é

- A) ptose palpebral.
- B) fraqueza e atrofia das mãos.
- C) dor no ombro.
- D) cefaleia.

### Questão 42

Assinale o tumor que **NÃO** apresenta disseminação hematogênica frequente para o pulmão.

- A) Sarcoma
- B) Carcinoma renal
- C) Carcinoma de tireoide
- D) Carcinoma testicular

### Questão 43

Entre as doenças pulmonares intersticiais, assinale a que cursa com linhas B de Kerley ao Rx de tórax.

- A) Sarcoidose
- B) Linfangite carcinomatosa
- C) Granuloma eosinofílico
- D) Proteinose alveolar

### Questão 44

Assinale a doença que **NÃO** se associa com Pneumonia intersticial linfocítica.

- A) Cirrose biliar primária
- B) Lúpus eritematoso sistêmico
- C) Miastenia *gravis*
- D) Anemia falciforme

### Questão 45

Em relação à doença veno-oclusiva, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Ocorrência familiar da doença tem sido observada.
- B) Pode estar associada a síndromes virais, exposição a toxinas e quimioterapia.
- C) O Rx de tórax pode mostrar sinais de hipertensão pulmonar com linhas B de Kerley proeminentes.
- D) A doença veno-oclusiva pode ser distinguida, com firmeza da hipertensão pulmonar primária, pelo cateterismo cardíaco.

### Questão 46

Das vasculites com envolvimento pulmonar significativo, assinale a que acomete grandes vasos.

- A) Granulomatose de Wegener
- B) Síndrome de Churg-Strauss
- C) Arterite de Takayassu
- D) Poliangeíte microscópica

### Questão 47

Entre os seguintes tumores benignos, assinale o que é o **mais comumente** encontrado no pulmão.

- A) Hamartoma
- B) Hemangioma
- C) Teratoma
- D) Condroma

### Questão 48

Fazem parte dos critérios de Wells para Tromboembolismo pulmonar, **EXCETO**

- A) hemoptise.
- B) sinais e sintomas de trombose venosa profunda.
- C) frequência cardíaca > 100 bpm.
- D) frequência respiratória > 30 irpm.

### Questão 49

Paciente de 50 anos, masculino, evolui com diarreia e massa em mediastino posterior. O diagnóstico **mais provável** seria

- A) Timoma.
- B) Linfoma.
- C) Neuroblastoma.
- D) Teratoma.

### Questão 50

Em relação ao diagnóstico de SARA, a relação  $PaO_2 / FIO_2$  se encontra

- A)  $\leq$  a 200 mmHg.
- B)  $\leq$  a 250 mmHg.
- C)  $\leq$  a 300 mmHg.
- D)  $\leq$  a 350 mmHg.

### Questão 51

Dos quadros abaixo, assinale o que se beneficia mais de ventilação mecânica não invasiva.

- A) Paciente com choque séptico e SARA
- B) Paciente com Pneumonia comunitária grave
- C) Paciente com contusão pulmonar unilateral após trauma torácico
- D) Paciente em edema agudo pulmonar de origem cardiogênica

### Questão 52

Em adultos jovens e adolescentes, a causa **mais comum** de Síndrome de veia cava superior é:

- A) Linfoma não Hodgkin.
- B) Linfoma de Hodgkin.
- C) Carcinoma de pequenas células.
- D) Adenocarcinoma pulmonar.

### Questão 53

A hipercalcemia como síndrome paraneoplásica, é **mais comum** no seguinte tipo celular de tumor pulmonar:

- A) Carcinoma de pequenas células.
- B) Carcinoma de células escamosas.
- C) Adenocarcinoma pulmonar.
- D) Linfoma não Hodgkin.

### Questão 54

Sobre a Síndrome de apneia obstrutiva do sono, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Quanto maior a gravidade menor aderência ao tratamento é observada.
- B) O dispositivo intraoral é boa opção de tratamento, em qualquer gravidade da doença.
- C) A interface máscara-paciente no uso do CPAP não é fator importante para definir aderência ao tratamento.
- D) O principal responsável pela sintomatologia da doença são os microdespertares.

### Questão 55

Paciente de 24 anos, masculino, portador de SIDA, evolui com quadro de Pneumonia. Apresenta derrame pleural à direita e consolidação em lobo inferior direito. O **menos provável** agente causal do processo seria:

- A) *Streptococcus pneumoniae*.
- B) *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Pneumocystis jirovesci*.

### Questão 56

Em relação à Síndrome da unha amarela, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anormalidade básica, responsável por esta síndrome, parece ser a hipoplasia de vasos linfáticos.
- B) A síndrome consiste na tríade deformidade das unhas, linfedema e derrame pleural.
- C) O derrame pleural é bilateral em 10 % dos casos.
- D) O derrame pleural é, usualmente, um exudato com predomínio de linfócitos.

### Questão 57

São causas de derrame pleural maciço com desvio mediastinal, **EXCETO**

- A) ICC.
- B) tromboembolismo pulmonar.
- C) empiema.
- D) tuberculose.

### Questão 58

Em relação ao uso prolongado de oxigênio domiciliar em paciente com DPOC, é **CORRETO** afirmar que

- A) seu uso está indicado, quando  $PO_2$  for menor que 60 mmHg em repouso.
- B) deve ser usado por, no mínimo, 10 horas por dia.
- C) deve ser administrado em pacientes com cor pulmonale.
- D) deve ser usado com fluxos acima de 3 litros/min.

### Questão 59

São manifestações pulmonares na Esclerose sistêmica, **EXCETO**

- A) fibrose intersticial pulmonar.
- B) hemorragia pulmonar.
- C) pneumonia de aspiração.
- D) doença vascular pulmonar isolada.

### Questão 60

Assinale a doença que leva à síndrome de hemorragia alveolar difusa e **NÃO** apresenta acometimento renal.

- A) Hemosiderose idiopática
- B) Granulomatose de Wegener
- C) Síndrome de Goodpasture
- D) Púrpura de Henoch-Schonlein

### Questão 61

As principais cadeias acometidas no paciente com Sarcoidose são:

- A) cervical e axilar.
- B) inguinal e epitrocLEAR.
- C) hilar e mediastinal.
- D) axilar e infraclavicular.

### Questão 62

São causas de falência no desmame da ventilação mecânica, **EXCETO**

- A) desnutrição.
- B) hipomagnesemia.
- C) hipertireoidismo.
- D) disfunção ventricular esquerda.

### Questão 63

São causas de Bronquiolite obliterante com pneumonia organizada (BOOP), **EXCETO**

- A) artrite reumatoide.
- B) linfoma.
- C) Espondilite anquilosante.
- D) granulomatose de Wegener.

### Questão 64

O padrão descrito como *crazy paving* na tomografia pulmonar de alta resolução é encontrado nas seguintes patologias, **EXCETO**

- A) proteinose alveolar.
- B) pneumocistose.
- C) linfangioleiomiomatose.
- D) pneumonia intersticial usual.

### Questão 65

Em relação à Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Ocorre, mais frequentemente, em portadores de SIDA com contagem de CD4 < 500.
- B) O achado de adenopatia intratorácica ao Rx de tórax é frequente.
- C) Pneumatocelos podem estar presentes no diagnóstico ou podem se desenvolver durante o tratamento.
- D) A droga de escolha para tratamento é a pentamidina.

### Questão 66

Em relação ao tratamento da Histoplasmose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria dos pacientes com Histoplasmose aguda requer tratamento.
- B) Casos severos de Histoplasmose progressiva, disseminada em pacientes não portadores de SIDA, são mais prontamente e agressivamente tratados com anfotericina B.
- C) O itraconazol é mais efetivo que o fluconazol e o ketoconazol.
- D) Doença pulmonar progressiva cavitária dos lobos superiores pode ser tratada com 400 mg/dia de itraconazol.

### Questão 67

Assinale a situação em que o uso de corticoide sistêmico na DPOC está indicado.

- A) No estágio III e IV da doença.
- B) Em todos os estágios da doença.
- C) Não está indicado seu uso.
- D) Nas exacerbações agudas da doença.

### Questão 68

Em relação às doenças supurativas do pulmão, podemos afirmar que

- A) os broncodilatadores devem ser usados, quando há confirmação de obstrução reversível ao fluxo aéreo.
- B) o fator de risco mais comum para o abscesso pulmonar de aspiração é o alcoolismo.
- C) o abscesso pulmonar de aspiração, em 50% dos casos, complica-se com empiema pulmonar.
- D) a espirometria nas bronquiectasias, normalmente, mostra um distúrbio restritivo.

### Questão 69

Em relação à Síndrome de Goodpasture, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O diagnóstico é baseado na dosagem sérica do anticorpo antimembrana basal que também é encontrado ligado à membrana basal pulmonar e renal.
- B) Em 60% a 80% dos casos, o pulmão e os rins são acometidos.
- C) O achado histológico renal é de uma *glomerulonefrite de lesões mínimas*.
- D) A presença de insuficiência renal, levando a oligoanúria, reduz a sobrevida para 50% em 06 meses.



### Questão 70

Em relação à crise aguda severa de Asma brônquica ou *Status asmaticus*, o **principal** exame que avalia a gravidade da crise e serve para acompanhamento do tratamento seria:

- A) Gasometria arterial.
- B) Espirometria.
- C) *Peak flow*.
- D) Raio x de tórax.

## FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D	21	A B C D	41	A B C D	61	A B C D
02	A B C D	22	A B C D	42	A B C D	62	A B C D
03	A B C D	23	A B C D	43	A B C D	63	A B C D
04	A B C D	24	A B C D	44	A B C D	64	A B C D
05	A B C D	25	A B C D	45	A B C D	65	A B C D
06	A B C D	26	A B C D	46	A B C D	66	A B C D
07	A B C D	27	A B C D	47	A B C D	67	A B C D
08	A B C D	28	A B C D	48	A B C D	68	A B C D
09	A B C D	29	A B C D	49	A B C D	69	A B C D
10	A B C D	30	A B C D	50	A B C D	70	A B C D
11	A B C D	31	A B C D	51	A B C D		
12	A B C D	32	A B C D	52	A B C D		
13	A B C D	33	A B C D	53	A B C D		
14	A B C D	34	A B C D	54	A B C D		
15	A B C D	35	A B C D	55	A B C D		
16	A B C D	36	A B C D	56	A B C D		
17	A B C D	37	A B C D	57	A B C D		
18	A B C D	38	A B C D	58	A B C D		
19	A B C D	39	A B C D	59	A B C D		
20	A B C D	40	A B C D	60	A B C D		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:**  
**AGUARDE AUTORIZAÇÃO**  
**PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**