



CONCURSO PÚBLICO - 2005

Médico: Otorrinolaringologia - OTORR

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - um **caderno de questões** contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
 - um **cartão de respostas** personalizado.
- É **responsabilidade do candidato** certificar-se de que:
 - o nome e o código do cargo ou o nome e o código da especialidade ou da área de atuação informado nesta capa de prova corresponde ao nome e código do cargo ou nome e código da especialidade ou da área de atuação informado em seu **cartão de respostas**;
 - o número do gabarito informado nesta capa de prova corresponde ao número do gabarito informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea a).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**.
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** faltando 1 (uma) hora para o término da prova (Edital 02/2005 – Item 9.9 alínea d).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente responde.
- O **cartão de respostas NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	22/11/2005	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	23 e 24/11/2005	NCE/UFRJ - Cidade Universitária Ilha do Fundão - Bloco C do CCMN
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final da PO	08/12/2005	www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou www.nce.ufrj.br/concursos



LÍNGUA PORTUGUESA

DIREITO À SAÚDE

Dalmo de Abreu Dallari

Quando se fala em saúde, a primeira idéia das pessoas é que se tem saúde quando não se tem doença. E muitos acham que não adianta querer ter saúde ou querer que o governo garanta a saúde porque muitas doenças acontecem por motivos que não dependem da vontade das pessoas ou das ações dos governos e por isso não podem ser evitadas. Para os que pensam desse modo parece estranho falar em direito à saúde. Será possível que uma pessoa possa ter o direito de não apanhar uma verminose, de não ter bronquite, de não contrair tuberculose ou sarampo?

Antes de tudo, para que se diga que uma pessoa tem saúde não basta que ela não sofra de alguma doença. Uma das organizações mais importantes do mundo especializada em assuntos de saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS), adverte que não é suficiente a ausência de doenças. Para que se diga que uma pessoa tem saúde é preciso que ela goze de completo bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer que, além de estar fisicamente bem, sem apresentar sinal de doença, a pessoa deve estar com a cabeça tranqüila, podendo pensar normalmente e relacionar-se com outras pessoas sem qualquer problema. É preciso também que a pessoa não seja tratada pela sociedade como um estorvo ou fardo repugnante e que possa conviver com as demais em condições de igualdade e de respeito.

Tudo isso faz parte da saúde. Assim, portanto, o direito à saúde, que deve ser assegurado a todas as pessoas de maneira igual, significa o direito de estar livre de condições que impeçam o completo bem-estar físico, mental e social.

01 - O tema do direito à saúde é tratado de forma impessoal; esse tratamento é construído, no texto, por meio de muitos elementos. Assinale aquele elemento que **NÃO** é representativo desse tratamento no primeiro período do texto:

- (A) a presença da terceira pessoa: *se tem saúde*;
- (B) a utilização do sujeito indeterminado: *se fala*;
- (C) o emprego do pronome *se*: *não se tem doença*;
- (D) o uso de palavras gerais: *pessoas*;
- (E) a construção negativa: *não se tem doença*.

02 - A alternativa que mostra uma maneira de reescrever-se o primeiro período do texto com alteração de seu sentido original é:

- (A) Quando se fala em saúde, a primeira idéia das pessoas é que, quando não se tem doença, se tem saúde;
- (B) Tem-se saúde quando não se tem doença, essa é a primeira idéia das pessoas quando se fala em saúde;
- (C) A primeira idéia das pessoas, quando se fala em saúde, é que se tem saúde quando não se tem doença;
- (D) Quando não se tem saúde tem-se doença, essa é a primeira idéia das pessoas quando se fala em saúde;
- (E) Ao se falar em saúde, a primeira idéia das pessoas é que se tem saúde sempre que não se tem doença.

03 - “Será possível que uma pessoa possa ter o direito de não apanhar uma verminose, de não ter bronquite, de não contrair tuberculose ou sarampo?”; o verbo TER é usado freqüentemente em lugar de outros de significado mais específico. No caso desse fragmento do texto, por exemplo, o verbo TER é empregado em lugar, respectivamente, de:

- (A) dispor de / contaminar-se;
- (B) usufruir / sofrer de;
- (C) utilizar / contrair;
- (D) ganhar / adquirir;
- (E) gozar / possuir.

04 - “muitos acham que não adianta querer ter saúde ou querer que o governo garanta a saúde”; para que os segmentos “querer ter saúde” e “querer que o governo garanta a saúde” tenham construção semelhante, a opção correta é:

- (A) querer ter saúde / querer garantir a saúde;
- (B) querer ter saúde / querer o governo garantir a saúde;
- (C) querer ter saúde / querer a saúde garantida pelo governo;
- (D) querer que se tenha saúde / querer que o governo garanta a saúde;
- (E) querer que a saúde seja tida / querer que o governo garanta a saúde.

05 - Os pensamentos citados no primeiro parágrafo do texto:

- (A) são comprovados com exemplos no restante do texto;
- (B) são apoiados pelo autor do texto;
- (C) são combatidos pelos parágrafos seguintes;
- (D) são considerados como um correto saber popular;
- (E) são vistos como consequência de interesses políticos.



06 - A presença da OMS, no segundo parágrafo do texto, serve para:

- (A) apoiar o pensamento do autor do texto;
- (B) mostrar que as doenças são parte da natureza humana;
- (C) demonstrar que, para se ter saúde, basta não estar doente;
- (D) indicar aos governos as ações necessárias ao combate à doença;
- (E) confirmar o interesse mundial pelo assunto abordado no texto.

07 - O conceito de “saúde” defendido pela OMS:

- (A) é oposto ao conceito generalizado;
- (B) é mais amplo que o conceito comum;
- (C) opõe um saber profissional ao saber popular;
- (D) contraria o conceito defendido pelos governos;
- (E) vê a saúde como fato exclusivamente social.

08 - O elemento do texto que tem seu valor indicado INCORRETAMENTE é:

- (A) “Assim, PORTANTO, o direito à saúde...” (§3) = conclusão;
- (B) “não seja tratada COMO um estorvo” (§2) = comparação;
- (C) “QUANDO se fala em saúde” (§1) = tempo;
- (D) “PORQUE muitas doenças acontecem” (§1) = causa;
- (E) “muitas doenças acontecem POR motivos” (§1) = meio.

09 - “Para que se DIGA...”, “que o governo GARANTA...”. Se, em lugar dos verbos destacados, tivéssemos, respectivamente, os verbos PROVER e INTERVIR, as formas correspondentes seriam:

- (A) proveja / intervinha;
- (B) prove / interveja;
- (C) provenha / intervisse;
- (D) proveja / intervenha;
- (E) provenha / interveja.

10 - “o completo bem-estar”; a forma plural desse segmento é:

- (A) os completos bem-estares;
- (B) os completos bem-estar;
- (C) os completos bens-estares;
- (D) os completos bens-estar;
- (E) o completo bem-estar.

SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

11 - Atualmente a organização das “portas de entrada” das instituições públicas de saúde no Rio de Janeiro se faz orientada pelo critério de:

- (A) oferta de serviços;
- (B) necessidade do usuário;
- (C) demanda do usuário;
- (D) atendimento referenciado;
- (E) adscrição de clientela.

12 - Das estratégias propostas pelo governo federal, aquela que busca reorientar a organização da “porta de entrada” das instituições públicas é:

- (A) Farmácia Popular;
- (B) QualiSUS;
- (C) Bolsa Família;
- (D) Brasil Sorridente;
- (E) Educação Permanente.

13 - Hierarquização do Sistema de Saúde significa organização por:

- (A) níveis diferentes de gestão;
- (B) áreas geográficas distintas;
- (C) programas específicos por patologias;
- (D) níveis de complexidade tecnológica;
- (E) critérios de vigilância epidemiológica.

14 - O Programa de Saúde da Família (PSF) foi ampliado pelo Ministério da Saúde nos dois últimos anos em 31%. Esta é uma estratégia de reorientação da atenção:

- (A) primária;
- (B) secundária;
- (C) terciária;
- (D) quaternária;
- (E) suplementar.

15 - Entre as características da organização do PSF encontra-se:

- (A) ampliação da necessidade de leitos hospitalares;
- (B) centralização do atendimento nos agentes comunitários de saúde;
- (C) atenção de populações em situação de risco;
- (D) ausência de encaminhamento para consultas especializadas;
- (E) cadastramento de famílias com adscrição de clientela.



16 - Em junho de 2005 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), parte integrante da política nacional de atendimento às urgências. Considerando a necessidade de classificação de risco para organização deste atendimento, estamos respeitando o princípio do SUS de:

- (A) universalidade;
- (B) descentralização;
- (C) equidade;
- (D) integralidade;
- (E) hierarquização.

17 - O Sistema Único de Saúde, cujo arcabouço jurídico-institucional é definido pela Constituição Federal de 1988 tem fundamentação legal nos dispositivos abaixo, EXCETO:

- (A) NOAS 1/2;
- (B) Lei n° 8080 / 1990;
- (C) Lei n° 8142 / 1990;
- (D) NOBs 91,92,93 e 96;
- (E) RDC n° 50 / 2002.

18 - O controle social previsto na regulação do Sistema de Saúde, com representação de usuários está presente na seguinte instância:

- (A) Conselhos de Saúde;
- (B) Comissão tripartite;
- (C) Comissão bipartite;
- (D) CONASS;
- (E) CONASEMS.

19 - O impacto da violência urbana na saúde da população é temática obrigatória entre gestores de saúde, que devem buscar iniciativas para minimizar estes índices. Em São Paulo, o Programa Escola da Família, que abre as escolas nos finais de semana para atividades da comunidade, resultou em queda no índice de homicídios em 57%, no porte de drogas em 81% e no de furtos em 45,5%. Esta iniciativa agrega dois princípios das ações do SUS, a saber:

- (A) equidade e regionalização;
- (B) integralidade e intersetorialidade;
- (C) universalidade e hierarquização;
- (D) controle social e equidade;
- (E) hierarquização e gratuidade.

20 - Considerando os números relativos à obesidade que revelam 16 % da população mundial acima do peso e 300 milhões de pessoas clinicamente obesas, das estratégias abaixo destinadas à população geral aquela que se correlaciona adequadamente com seu objetivo de prevenção é:

- (A) taxação de fast foods → redução do consumo → terciária;
- (B) estímulo ao aleitamento materno → melhor controle do bebê sobre a quantidade ingerida → primária;
- (C) estímulo à caminhadas para o deslocamento → aumento do gasto calórico → específica;
- (D) proibição de máquinas de refrigerantes em escolas → estímulo aos sucos naturais → secundária;
- (E) oferta de cirurgias bariátricas pelo SUS → redução da capacidade alimentar → primordial.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

21 - Bloqueio átrio ventricular ocorre, mais comumente, durante o uso de:

- (A) doperidol;
- (B) lítio;
- (C) cocaína;
- (D) teofilina;
- (E) anfetamina.

22 - O antídoto específico para a intoxicação pelo acetaminofen é:

- (A) nitrito de sódio;
- (B) naloxone;
- (C) piridoxina;
- (D) acetil cisteína;
- (E) atropina.

23 - O fluconazol pode provocar mais frequentemente:

- (A) hepatite;
- (B) neurite;
- (C) cálculo renal;
- (D) pancreatite;
- (E) miopatia.

24 - O anti-hipertensivo, usado no tratamento de urgência da hipertensão arterial, que atua como vaso dilatador é:

- (A) furosemida;
- (B) enalapril;
- (C) nifedipina;
- (D) captopril;
- (E) hidralazina.



25 - A alteração laboratorial mais frequentemente associada ao lúpus eritematoso sistêmico é:

- (A) anemia;
- (B) leucopenia;
- (C) trombocitopenia;
- (D) proteinúria;
- (E) hematúria.

26 - A queimadura de um membro superior inteiro, em adulto, corresponde a uma área corporal de cerca de:

- (A) 2%;
- (B) 4%;
- (C) 9%;
- (D) 15%;
- (E) 17%.

27 - É cefalosporina de 3ª geração:

- (A) cefalexina;
- (B) cefalotina;
- (C) cefotaxina;
- (D) cefaxitin;
- (E) cefadroxil.

28 - A maior concentração de sódio ocorre em secreção de:

- (A) glândula sudorípara;
- (B) bile;
- (C) estômago;
- (D) íleo;
- (E) duodeno.

29 - Além da glicemia de jejum, o exame mais indicado para acompanhar um doente com Diabetes mellitus é:

- (A) insulinemia;
- (B) curva glicêmica;
- (C) HOMA;
- (D) GAD65;
- (E) hemoglobina glicosilada.

30 - É causa de hipopotassemia:

- (A) insuficiência renal aguda;
- (B) uso de espironolactona;
- (C) amiloidose;
- (D) alcalose;
- (E) lúpus eritematoso sistêmico.



OTORRINOLARINGOLOGIA

31- Em relação à otite externa maligna, analise as afirmativas a seguir:

- I - é uma infecção invasiva e necrotizante, que acomete geralmente diabéticos, idosos e imunodeprimidos.
- II - o diagnóstico é feito pelo quadro clínico, exame histopatológico, cultura da secreção, dosagem da VHS, tomografia computadorizada, cintilografia com gálio citrato 67 e cintilografia com tecnécio 99m MDP.
- III - o acompanhamento deve ser feito pelo exame clínico, dosagens seriadas da VHS e cintilografia seriada com tecnécio 99m MDP, por pelo 2 anos.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

32 - Em relação aos tumores de glândulas salivares, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) o tumor de Warthin é o tumor maligno mais comum em homens (25:1);
- (B) o adenocarcinoma de células acinares acontece mais comumente na parótida, de forma unilateral, sendo mais freqüente em mulheres (3:2);
- (C) o carcinoma adenóide cístico é o tumor maligno mais comum das glândulas salivares intraorais;
- (D) o cistoadenocarcinoma é um tumor maligno raro, com formações císticas proeminentes e freqüentemente crescimento papilar;
- (E) o carcinoma mucoepidermóide ocorre em glândulas salivares maiores e menores, tendo predileção pela parótida e por glândulas salivares menores da cavidade oral.

33 - Em relação à síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), analise as afirmativas a seguir:

- I - são afecções comuns: sarcoma de Kaposi, molusco contagioso, dermatite seborréica; monilíase oral, gengivite, úlceras herpéticas gigantes e leucoplasia pilosa;
- II - a leucoplasia pilosa é uma lesão branca na borda livre da língua, causada pelo citomegalovírus;
- III - mais de 50% dos pacientes com SIDA têm sinais ou sintomas na região da cabeça e pescoço.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

34 - NÃO faz parte do complexo ostiomeatal da parede lateral das fossas nasais:

- (A) processo unciforme (uncinado);
- (B) hiato semilunar;
- (C) bulla etmoidal;
- (D) óstio primário do seio maxilar;
- (E) célula de Onodi.

35 - Assinale a afirmativa correta:

- (A) a eminência arqueada, corresponde ao canal semicircular superior;
- (B) o triângulo de Trautmann é uma área triangular, tendo como base superior a dura-máter da fossa média; na frente o seio sigmóide e atrás a porção horizontal da artéria carótida interna ;
- (C) no promontório localiza-se o plexo nervoso de Rivinus;
- (D) do processo cocleariforme surge o tendão do músculo tensor do estribo;
- (E) o nervo corda do tímpano emerge do gânglio geniculado.

36 - Com relação ao etmóide, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) a primeira lamela é representada pelo processo uncinado, a segunda pela bula etmoidal e a terceira é a lamela basal da concha média;
- (B) a célula de Haller é definida como a pneumatização da célula mais posterior, onde é aparente um abaulamento do canal óptico no interior do etmóide posterior;
- (C) lateralmente ao seio esfenoidal estão localizadas estruturas como a artéria carótida interna, o nervo óptico e o terceiro, quarto, quinto e sexto nervos cranianos;
- (D) a inervação sensorial é feita pelo nervo maxilar, ramo do trigêmeo;
- (E) a drenagem venosa do complexo etmoidal é feita para o seio cavernoso, veias faciais e tributárias do plexo pterigóideo.

37 - É correto afirmar que:

- (A) os músculos intrínsecos da laringe são pares e restritos à laringe;
- (B) o cônus elástico, a epiglote e o ligamento vocal definem o espaço pré-epiglótico;
- (C) o músculo cricoaritenóideo lateral é o músculo abductor das pregas vocais;
- (D) o ventrículo ou seio de Morgagni é um pequeno espaço entre a banda ventricular e a prega vocal;
- (E) o espaço de Heinke é limitado pela prega ariepiglótica, aritenóide e membrana tireoidea.



38 - Observe as afirmativas a seguir, em relação à paralisia facial:

I – para o topodiagnóstico são usados: teste do lacrimejamento, teste com o estimulador de Hilger, pesquisa do reflexo estapédico, avaliação do paladar e do fluxo salivar.

II – são ramos intrapétreos do nervo facial: nervoso petroso superficial maior, ramo estapédico e nervo corda do tímpano.

III – são três as categorias de lesão: neurotmeze – bloqueio fisiológico, sem degeneração valeriana; axonotmeze – comprometimento parcial dos axônios e bainhas de mielina, com neurilema contínuo; neuropraxia – interrupção completa do nervo, sem possibilidade de regeneração.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

39 - Com relação à doença de Ménière é correto afirmar que:

- (A) na audiometria tonal do início da doença, há perda nas frequências agudas, e com o evoluir, há o acometimento nas frequências graves;
- (B) não se identifica recrutamento nos testes supraliminares;
- (C) na audiometria de tronco cerebral (BERA) há o aumento do intervalo entre as ondas I e V;
- (D) a emergência do tendão do músculo tensor do martelo é muitas vezes responsável pela hidropsia labiríntica;
- (E) a eletrococleografia mostra alterações no caso de hidropsia labiríntica.

40 - **NÃO** é correto afirmar com relação a otospongiose (otosclerose):

- (A) pode ocorrer a tríade de Bézold;
- (B) no grau I de Schwambach têm-se: curva aérea ascendente e óssea normal ou com entalhe de Carhart em 2000 Hz;
- (C) o reflexo estapédico encontra-se ausente ou com o efeito *on-off*;
- (D) é a doença retrococlear mais freqüente na população feminina, com agravamento na gestação e/ou na menopausa;
- (E) na otoscopia podemos encontrar a mancha de Schwartze.

41 - Em relação à vertigem postural paroxística benigna, analise as afirmativas a seguir:

I – vertigens rotatórias com nistagmos horizontais ou horizonte-rotatórios, quando assumem determinadas posições da cabeça.

II – a história clínica sugere o diagnóstico, que é confirmado pela manobra de Dix-Hallpike.

III – a vertigem dura de 1 a 40 segundos, surge 3 a 4 segundos, após assumir a posição desencadeante. Ausência de hipoacusia ou zumbidos.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

42 - Com relação ao neuroma do acústico (schwannoma vestibular) é correto afirmar que:

- (A) ocorre sempre de forma bilateral;
- (B) na maioria dos casos, o teste de discriminação vocal se encontra preservado, com índices maiores do que 90%;
- (C) no exame eletroneistagmográfico, o neuroma do acústico se apresenta geralmente como uma síndrome periférica deficitária;
- (D) no BERA os achados são: preservação do intervalo de latência entre as ondas I e V, e aparecimento da onda V sem a onda I;
- (E) a degeneração maligna do schwannoma é freqüente.

43 - Com relação às massas cervicais, **NÃO** é correto afirmar:

- (A) o exame citológico de material aspirado por agulha fina é o método inicial de avaliação das massas cervicais;
- (B) os linfangiomas são classificados em capilar, cavernoso e cístico;
- (C) os hemangiomas são os tumores mais comuns da infância, acometendo cerca de 12% das crianças abaixo de 2 anos;
- (D) a sarcoidose é uma doença granulomatosa causada pelo *Mycobacterium avium* com linfadenomegalia em 75-90% dos casos;
- (E) a mononucleose é causada pelo Epstein-Barr vírus, sendo causa de linfadenopatia em 80 a 90% dos casos.



44 - Com relação ao câncer da laringe é correto afirmar que:

- (A) os tumores primitivos da região subglótica são raros ;
- (B) os tumores T1 em terço médio de pregas vocais dão metástases cervicais precoces;
- (C) o tratamento para os tumores subglóticos é a laringectomia horizontal;
- (D) mais de 90% dos tumores malignos da laringe são do tipo adenocarcinoma, originados do epitélio de revestimento;
- (E) nos pacientes com tumor glótico T3 ou T4 é raro o acometimento da mobilidade da prega vocal.

45 - Em relação ao estudo tomográfico computadorizado da orelha média, analise as afirmativas a seguir:

I – a erosão da parede lateral do epítimpano, com apagamento do esporão de Chaussé ou muro da lojeta e o aumento do espaço de Proussak, são achados compatíveis com otite média aguda.

II – pode identificar eventuais complicações como fístulas labirínticas, acometimento do canal de Falópio e de estruturas correlatas como a dura-máter e o seio sigmóide.

III – na otospongiose, pode ser identificado o foco de descalcificação na cápsula labiríntica.

Assinale:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

46 - Observe as afirmativas a seguir, em relação às emissões otoacústicas:

I – é um método subjetivo de avaliação auditiva.

II – o estudo dos produtos de distorção das emissões otoacústicas pode ser usado para a triagem auditiva neonatal.

III – têm origem nas células ciliadas internas do órgão de Corti, podendo ser espontâneas ou evocadas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

47 - Em relação ao BERA, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) as origens das 5 ondas de importância clínica são: I - nervo auditivo; II - núcleo coclear; III - complexo olivar; IV - leminisco lateral e V - colículo inferior;
- (B) nas disacusias condutivas há o alargamento dos intervalos interpicos I - III e I - V;
- (C) serve como coadjuvante no diagnóstico de morte cerebral;
- (D) é usado para monitorização intra-operatória das cirurgias onde se manipula o VIII nervo e o tronco;
- (E) a resposta normal é: limiar igual ou menor que 30 dB, com intervalo interpico de V-I de até 4,5 milissegundos, e amplitude de V maior que a de I.

48 - Avalie as afirmativas a seguir, em relação à laringe:

I – a anomalia de Arnold-Chiari é a etiologia central mais freqüente relacionada à paralisia congênita de prega vocal , na maioria das vezes bilateral.

II – o diafragma laríngeo é uma fenda na região posterior da laringe, comunicando-a com a hipofaringe e eventualmente com o esôfago.

III – a laringomalácia é a causa mais freqüente de estridor laríngeo no primeiro ano de vida, sendo raros os casos que não se estabilizam com um ano de vida.

Assinale:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

49 - Sobre a fisiologia do equilíbrio, **NÃO** é correto afirmar:

- (A) os ductos semicirculares são sensores da aceleração angular, promovendo o equilíbrio estático;
- (B) formam pares funcionais: os ductos laterais direito e esquerdo; os ductos superior direito e posterior esquerdo; e os ductos superior esquerdo e posterior direito;
- (C) a corrente endolinfática produz sensação subjetiva de rotação no plano do canal excitado, nistagmo, reações musculares; e sua direção é referida pelo sentido da componente rápida do nistagmo;
- (D) o saco endolinfático equilibra a pressão entre o saco endolinfático e o espaço subaracnóideo, e absorve endolinfa;
- (E) o sáculo e o utrículo são sensores da aceleração linear.



50 - Assinale a afirmativa correta:

- (A) na otite média serosa observa-se: disacusia condutiva e curva timpanométrica tipo A;
- (B) nas doenças retrococleares, como a doença de Ménière, o recrutamento pode ser identificado pelos métodos de Metz e Fowler;
- (C) o teste do glicerol é considerado positivo para as doenças retrococleares, quando há a melhora de 10 dB em pelo menos 1 a 2 frequências da palavra ;
- (D) nas perdas auditivas induzidas pelo ruído, a perda auditiva inicia-se na frequência de 1000 Hz, que é a zona de hipersensibilidade do órgão de Corti;
- (E) na disacusia sensorial observa-se: Rinne positivo encurtado, Schwabach encurtado, Weber lateralizado para a orelha normal ou melhor, presença de recrutamento e diplacusia.

51 - **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) o diagnóstico da Rinoscleroma é feito pela pesquisa de células de Mikulicz, no exame histopatológico e da bactéria *Klebsiella rhinoscleromatis*, no exame de cultura;
- (B) na forma virchoviana da Hanseníase, a pesquisa de bacilo na linfa é quase sempre positiva. É uma forma anérgica e grave;
- (C) a histoplasmose é causada pelo protozoário *Histoplasma capsulatum*;
- (D) a granulomatose de Wegener pode ser confirmada pela pesquisa do C-ANCA;
- (E) o agente da blastomicose é o *Paracoccidioidomycosis brasiliensis*.

52 - É correto afirmar que:

- (A) os tumores de hipofaringe metastatizam principalmente para os linfonodos jugulo-carotídeos – níveis II, III e IV;
- (B) o angiofibroma juvenil é a neoplasia maligna mais comum na região da cabeça e pescoço nos adolescentes do sexo masculino;
- (C) a otalgia reflexa, associada aos tumores de hipofaringe, tem como via aferente o nervo de Billroth;
- (D) o adenocarcinoma é o tumor mais freqüente da laringe;
- (E) as localizações mais freqüentes do linfoma na região da cabeça e pescoço são o assoalho bucal e a língua.

53 - Observe as afirmativas a seguir, em relação ao papiloma invertido:

- I – o papiloma invertido é um tumor nasal raro (0,5-7% dos tumores nasais) com crescimento epitelial neoplásico em direção ao estroma subjacente.
- II – os sintomas mais comuns são: obstrução nasal bilateral mantida (98% dos casos) , epistaxe e anosmia.
- III – no exame endoscópico observa-se a presença de massa lisa, avermelhada, coberta por secreção e exudato fibrinoso.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

54 - Com relação à polipose nasossinusal é correto afirmar que:

- (A) a tríade de Samter é observada em pacientes com asma, polipose e vasculite alérgica;
- (B) a síndrome de Young é uma discinesia ciliar primária relacionada à bronquiectasia e situs inversus;
- (C) o pólipio antrocoanal de Killian está relacionado à asma e à intolerância a salicilatos;
- (D) os pacientes com fibrose cística têm elevada incidência de polipose nasossinusal e de pseudomucocele;
- (E) pelo potencial de malignização, está indicada a radioterapia no pós-operatório dos pacientes de polipose nasossinusal em estágio IV.

55 - Com relação à laringoscopia, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) Nas paralisias nucleares, as lesões dos neurônios motores inferiores do núcleo do vago resultam em paralisia laríngea flácida;
- (B) A lesão do nervo laríngeo superior leva inicialmente à paralisia mediana, que evolui para a posição paramediana;
- (C) O sulco vocal é uma lesão em forma de fenda ou depressão longitudinal na prega vocal, paralela à borda livre;
- (D) O granuloma laríngeo ocorre principalmente no 1/3 posterior das pregas vocais ;
- (E) O nódulo vocal ocorre mais freqüentemente em borda livre de pregas vocais, em junção de 1/3 médio com 1/3 anterior.



56 - Em relação às laringites na infância, observe as afirmativas a seguir:

I – a epiglote é uma infecção aguda, de etiologia bacteriana, com quadro de angústia respiratória aguda e rapidamente evolutiva.

II – a laringite estridulosa é uma das formas mais frequentes de laringite em crianças e na nasofaringolaringoscopia observa-se o edema subglótico.

III – a papilomatose juvenil tem maior incidência entre 1 e 3 anos de vida, com sintomas progressivos como: rouquidão, disфония e estridor. Apresenta-se com lesões múltiplas confluentes em pregas vocais e comissura anterior.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.

57 - Com relação às sialoadenites é correto afirmar que:

- (A) na parotidite epidêmica, a secreção glandular é mucopurulenta;
- (B) a sialolitíase acomete preferencialmente a glândula parótida;
- (C) a rânula é uma forma de sialoadenose cujo tratamento é a marsupialização;
- (D) na SIDA, as parótidas podem estar acometidas com múltiplos cistos linfoepiteliais nas glândulas;
- (E) a parotidite epidêmica é causada pelo coxsackie vírus, cuja profilaxia é feita pela vacinal tríplice viral.

58 - Com relação ao edema de Reinke, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) a drenagem linfática escassa na camada superficial da lâmina própria prejudica a absorção do edema inicialmente acumulado;
- (B) o espaço de Reinke corresponde a camada superficial da lâmina própria, onde ocorre a deposição de material gelatinoso;
- (C) predomina em paciente do sexo masculino, com idade entre 20 e 30 anos;
- (D) geralmente é bilateral, simétrico ou não;
- (E) história de rouquidão persistente e progressiva em tabagistas.

59 - Assinale a afirmativa correta:

- (A) os cistos branquiais são remanescentes de aparatos branquiais. São mais frequentes de 1º e de 4º arco;
- (B) a infecção do espaço retrofaríngeo é mais frequente na população pediátrica;
- (C) o trismo e o abaulamento da parede lateral em direção à amígdala palatina são sinais típicos da fasciíte necrotizante.
- (D) os tumores de hipofaringe e de tireóide dão metástases precoces para os linfonodos submentonianos;
- (E) a doença da arranhadura do gato é causada pelo *Staphylococcus aureus* e/ou *Streptococcus* do grupo A.

60 - Observe as afirmativas a seguir:

I – O anel linfático de Waldeyer pertence a um grupo de órgãos linfoepiteliais que fazem companhia às placas de Peyer (bursa de Fabricci das aves).

II – A superfície interna da faringe é revestida por epitélio cilíndrico ciliado na naso e orofaringe e pavimentoso estratificado na hipofaringe.

III – Angina é todo processo inflamatório e/ou infeccioso, de origem local ou geral, da mucosa faríngea.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I está correta;
- (B) se apenas a afirmativa II está correta;
- (C) se apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) se apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) se todas as afirmativas estão corretas.



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>